





ਆਈ. ਸੀ. ਏ. ਆਰ - ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ
ਨਰਮੇ-ਕਪਾਹ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ (25 ਤੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ 2016) ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ
 "ਇਹ ਸਲਾਹਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ"

ਮਿਤੀ	ਮੀਂਹ (ਮਿ.ਮੀ.) ਜੁਲਾਈ														ਸਲਾਹ	
	ਮੀਂਹ ਪਏਆ										ਮੀਂਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ					ਸਲਾਹ
	W (14-20 ਜੁਲਾਈ)	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
ਪੰਜਾਬ															ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 20 ਪਿੰਡ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ 6 ਪਿੰਡ, ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ	
ਬਠਿੰਡਾ	23.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	0	ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 6 ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ	
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ	22	0	0	0	0	0	6	1.3	0	0	5	5	3	0	ਚਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਮਾ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਤੇ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਆਪਣੀ ਨੁਕਸਾਨੀ	
ਮੁਕਤਸਰ	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	4	5	0	ਆਰਥਿਕ ਕਗਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦੇ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ	
ਮਾਨਸਾ	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	10	6	ਡਾਇਓਕਿਊਰਾਨ @ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਜਾਂ ਸਪਾਇਰੋਮੈਸੀਫਿਨ ਅਤੇ ਚਿੱਟੀ	
ਹਰਿਆਣਾ															ਮੱਖੀ ਦੇ ਬਾਲਗਾਂ ਤੇ ਹਰੇ ਤੇਲੇ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਓਲਾਲਾ ਦੇ ਛਿੜਕਾਅ ਦੀ	
ਸਿਰਸਾ	1.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	9	4	ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਰਮਾ-ਕਪਾਹ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤੇ	
ਹਿਸਾਰ	48.6	11.5	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	7	29	ਹਰੇ ਤੇਲੇ ਦੀ ਰੋਜ਼ 4-6 ਪ੍ਰਤੀ ਪੱਤਾ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਹਤਮੰਦ ਕਪਾਹ ਦੀ	
ਫਤਿਹਾਬਾਦ	33.7	3.3	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	8	15	ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਤਕਨੀਕਾਂ 2016-17 ਦੁਆਰਾ ਆਈ.ਸੀ.ਏ.ਆਰ./ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ.ਆਰ	
ਰਾਜਸਥਾਨ															ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।	
ਹੰਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ	20.7	10	0.1	0	0.9	0	0.6	0.3	0	2	2	5	5	3	ਨਰਮਾ-ਕਪਾਹ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਅਤੇ ਨਦੀਨਾਂ ਉਤੇ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ	
ਸ੍ਰੀ ਗੰਗਾਨਗਰ	3.6	0.4	1	0	0	0	0.2	0	0	2	2	5	5	3	ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵੱਟ ਬੰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਦੀਨਾਂ	

ਬਾਂਸਵਾੜਾ	29.4	11.6	0.4	0	0	0	11.1	12.1	0.6	5	7	7	6	4	<p>ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰਮਾ-ਕਪਾਹ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਵਿਲਟ ਦਾ ਰੋਗ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 10 ਪੀ.ਪੀ.ਐਮ ਕੋਬਾਲਿਟ ਕਲੋਰਾਈਡ (10 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ) ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬੂਟਿਆਂ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦਿਸਣ ਤੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਟ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਨਰਮਾ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਨਾਈਟਰੋਜਨ ਦੀ ਤੀਜੀ ਕਿਸ਼ਤ (40-45 ਕਿਲੋ ਯੂਰੀਆ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ) ਦਿਓ। ਹਿਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਨਰਮਾ-ਕਪਾਹ ਦੀ ਫਸਲ ਆਪਣੀ ਟੀਡੇ ਲੱਗਣ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਰਮਾ-ਕਪਾਹ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਹਰੇ ਤੇਲੇ ਦਾ ਹਮਲਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਸਾ ਵਿੱਚ, ਨਰਮਾ-ਕਪਾਹ ਦੀ ਫਸਲ (65-80 ਦਿਨ) ਆਪਣੀ ਮੁਢਲੀ, ਫੁੱਲ-ਭੋਡੀ ਅਤੇ ਟੀਡੇ ਲੱਗਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਰਮਾ-ਕਪਾਹ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਗੋਡਾਈ, ਕੱਖ ਮਾਰਨਾ ਆਦਿ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਰਮਾ-ਕਪਾਹ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਬਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਦੀਨਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰ.ਸੀ.ਐਚ 650 ਬੀਜੀ-2 ਉਤੇ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10-17 ਪ੍ਰਤੀ 3 ਪੱਤਾ (ਐਸਤਨ 14.2 ਪ੍ਰਤੀ 3 ਪੱਤਾ), ਐਚ.ਐਸ-6 (ਰੇਜ਼ 11-23 ਅਤੇ ਐਸਤਨ 17.7 ਪ੍ਰਤੀ 3 ਪੱਤਾ), ਰੰਗਾ ਨਗਰ ਅਗੋਤੀ (ਰੇਜ਼ 5-11 ਅਤੇ ਐਸਤਨ 7.7 ਪ੍ਰਤੀ 3 ਪੱਤਾ), ਆਰ.ਐਸ-20-13 (ਰੇਜ਼ 4-11 ਅਤੇ ਐਸਤਨ 7.3 ਪ੍ਰਤੀ 3 ਪੱਤਾ) ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਸਪਰੇਅ ਦੇ ਛਿੜਕਾਅ ਵਾਲੇ ਨਰਮਾ-ਕਪਾਹ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇ ਤੇਲੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 21-39 ਪ੍ਰਤੀ 3 ਪੱਤਾ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਰਸਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ</p>
----------	------	------	-----	---	---	---	------	------	-----	---	---	---	---	---	--



ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ (ਐਨ.ਪੀ.ਕੇ.) ਦੀ ਖਾਦ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਕੇ ਨਰਮਾ-ਕਪਾਹ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਛਿੜਕਾਅ ਨਾ ਕਰਨ।