

ਆਈ. ਸੀ. ਏ. ਆਰ - ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ
ਨਰਮੇ-ਕਪਾਹ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ (15 ਤੋਂ 21 ਅਗਸਤ 2016) ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ

“ਇਹ ਸਲਾਹਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ”

ਸਿਤੀ	4 to 10	ਅਗਸਤ											ਸਲਾਹ		
		ਮੀਂਹ ਪਿਆ							ਮੀਂਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ						
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		21	
ਪੰਜਾਬ															ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਨਰਮਾ-ਕਪਾਹ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਆਪਣੀ ਫੁੱਲ-ਡੋਡੀ ਅਤੇ ਟੀਡੇ ਲੱਗਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਰਮਾ ਕਪਾਹ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਖ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇੰਟਰ ਕਲਚਰਲ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਰਮਾ-ਕਪਾਹ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਕਗਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਨਰਮਾ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਕਗਾਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਰਮਾ-ਕਪਾਹ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵਿੱਚ ਪੱਤਾ ਮਰੋੜ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਰੋਗ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਗ੍ਰੇਡ 1 ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਡ 3 ਤੱਕ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਰਮਾ ਕਪਾਹ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਝੁਲਸ ਰੋਗ ਦਾ ਹਮਲਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸੀ ਕਪਾਹ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਨ ਅਤੇ ਚਿਤਕਬਰੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਹਮਲਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਰਮਾ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਟੀਡੇ ਪੱਕਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਸਰਵਪੱਖੀ ਕੀਟ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬਠਿੰਡਾ	27.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ	0.7	0	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ਮੁਕਤਸਰ	0	0	0	55.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ਮਾਨਸਾ	17	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ਹਰਿਆਣਾ															
ਸਿਰਸਾ	9.5	0	0	1	0	1.8	0	0	0	0	0	0	0		
ਹਿਸਾਰ	3.6	0.1	0.8	0.7	3.8	0	0	0	0	0	0	0	5		
ਫਤਿਹਾਬਾਦ	0	0	0	0	9.3	0	0	0	0	0	0	0	3		
ਰਾਜਸਥਾਨ															
ਹੰਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ	4.3	0	1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ਸ੍ਰੀ ਗੰਗਾਨਗਰ	23.7	0	1.4	3.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ਬਾਂਸਵਾੜਾ	201.8	35.1	10.5	2.2	0.2	0	0	0	1.3	0.7	0.5	6.3	1.8		