


ਆਈ. ਸੀ. ਏ. ਆਰ - ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ  
ਨਰਮੇ-ਕਪਾਹ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ (29 ਅਸਗਤ ਤੋਂ 4 ਸਤੰਬਰ 2016) ਹਫਤੇ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ




“ਇਹ ਸਲਾਹਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ”

ਮਿਤੀ	ਮੀਂਹ ਪਾਇਆ									ਮੀਂਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ				ਸਲਾਹ
	18to24	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	
ਪੰਜਾਬ														<p>ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਭਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਮਾ-ਕਪਾਹ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਆਪਣੀ ਟੀਡੋਂ ਲੱਗਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਰਮਾ-ਕਪਾਹ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਟੀਡੋਂ ਨਾ ਫਟਣ। ਨਰਮਾ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਕੀੜਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਟਾਂ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਕਰਾਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਨਰਮਾ-ਕਪਾਹ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆਂ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਰਮਾ-ਕਪਾਹ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵਿੱਚ ਪੱਤਾ ਮਰੋੜ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਰੋਗ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਗ੍ਰੇਡ 1 ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਡ 3 ਤੱਕ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਰਮਾ ਕਪਾਹ ਦੇ ਕੁੱਝ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਝੁਲਸ ਰੋਗ ਦਾ ਹਮਲਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਕਰਾਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਪਰੇਅ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫ਼ਸਲ ਆਪਣੀ ਪੱਕਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ, ਮੁਕਤਸਰ ਅਤੇ ਫਜ਼ਿਲਕਾ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ 119 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸ ਚੂਸਣ ਵਾਲੇ ਕੀੜੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਹਰਾ ਤੇਲਾ ਅਤੇ ਭੂਰੀ ਜੁੰ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਕਰਾਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 14 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚੋਂ ਲਹਿਰੀ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ 2 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੀ ਟੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਉੱਤੇ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਕਰਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਨਰਮਾ-ਕਪਾਹ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ</p>
ਬਠਿੰਡਾ	23	0	4	0	10	70	33.5	6	0	0	0	0	0	
ਫਿਰੋਜਪੁਰ	0	0	10	4.3	2.5	24.7	3	0	0	0	0	0	0	
ਮੁਕਤਸਰ	0	0	3	4	0	36.3	1.2	0	0	0	0	0	0	
ਮਾਨਸਾ	0	0	9.8	0	0	0	0	17.4	0	3	0	0	0	
ਹਰਿਆਣਾ														
ਸਿਰਸਾ	3.8	0	17.3	0	4.8	18.8	20.5	17	0	3	0	0	0	
ਹਿਸਾਰ	1.9	0	8.1	0	1	0	11.6	15.9	0	10	0	0	0	
ਫਤਿਹਾਬਾਦ	0	0	16.7	0	1	0	21.3	17.7	0	6	0	0	0	
ਰਾਜਸਥਾਨ														
ਹਨੁਮਾਨਗੜ੍ਹ	0.6	0	5	6.1	3.1	3	32.1	16.7	5	4	3	0	0	
ਸ੍ਰੀ ਗੰਗਾਨਗਰ	3.6	0	5.6	0.6	0	9.9	16.8	0	5	4	3	0	0	
ਬਾਂਸਵਾੜਾ	203.4	30.6	0.8	2.4	0.2	7.1	1.9	1.2	6	6	5	4	2	



ਬੂਟਿਆਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਰਮਾ-ਕਪਾਹ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼/ਸਿਚੀਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਰਾਂ ਵਿਲਟ ਰੋਗ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 10 ਪੀ ਪੀ ਐਠਾ ਕੋਬਾਲਟ ਕਲੋਰਾਈਡ (10 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ) ਨੂੰ ਰੋਗ ਨਾਲ ਬੂਟਿਆਂ ਤੇ ਲੱਛਣ ਦਿਸਣ ਉਪਰੰਤ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਖੇ, ਸਿਰਸਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਰਮਾ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਰ ਸੀ ਐਚ-650 ਬੀ.ਜੀ.2 ਉੱਤੇ 9-18 ਪ੍ਰਤੀ 3 ਪੱਤਾ (ਔਸਤਨ 10.2 ਪ੍ਰਤੀ ਤਿੰਨ ਪੱਤਾ, ਐਚ.ਐਸ.-6 ਉੱਤੇ 8-14 ਪ੍ਰਤੀ ਤਿੰਨ ਪੱਤਾ (ਔਸਤਨ 17.6 ਪ੍ਰਤੀ ਪੱਤਾ) ਗੰਗਾਨਗਰ ਅਗੇਤੀ ਉੱਤੇ 14-21 ਪ੍ਰਤੀ ਤਿੰਨ ਪੱਤਾ (ਔਸਤਨ 13.4 ਪ੍ਰਤੀ ਤਿੰਨ ਪੱਤਾ) ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.-2013 ਉੱਤੇ 16-17 ਪ੍ਰਤੀ ਤਿੰਨ ਪੱਤਾ (ਔਸਤਨ 16 ਪ੍ਰਤੀ ਤਿੰਨ ਪੱਤਾ) ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਨਰਮਾ-ਕਪਾਹ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਕਰਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਰਮਾ-ਕਪਾਹ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵਿੱਚ ਹਰੇ ਤੇਲੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 0-2 ਪ੍ਰਤੀ ਤਿੰਨ ਪੱਤਾ ਅਤੇ ਭੂਰੀ ਜੂ 0-6 ਪ੍ਰਤੀ ਤਿੰਨ ਪੱਤਾ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸੀ ਕਪਾਹ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਚਿਤਕਬਰੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਹਮਲਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ ਦਾ ਪੱਤਾ ਮਰੇੜ ਵਿਸ਼ਾਯੂ ਰੋਗ ਦਾ ਹਮਲਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੇਸੀ ਕਪਾਹ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਤਕਬਰੀ ਸੁੰਡੀ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਕਰਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਾਈਨੋਸੈਡ 60 ਮਿਲੀਮਿਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਰਮਾ-ਕਪਾਹ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ

					<p>ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਖੜੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਿਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਰਮਾ-ਕਪਾਹ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਆਪਣੀ ਫੁੱਲ-ਡੋਡੀ ਦੀ ਅਵੱਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਰਮਾ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਅਤੇ ਹਰਾ ਤੇਲਾ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਕਰਾਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿਸਾਰ, ਜੀਂਦ, ਭਿਵਾਨੀ, ਕੈਂਥਲ ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਰਿਵਾੜੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਰਮਾ-ਕਪਾਹ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਤਾ ਮਰੋੜ ਰੋਗ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਨਾ ਮਾਤਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਡ 3 ਪ੍ਰਤੀ ਪੱਤਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਰਮਾ-ਕਪਾਹ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਝੁਲਸ ਦੀ ਰੋਗ ਦਾ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।</p>
--	---	--	---	---	---