

ਆਈ.ਸੀ.ਏ.ਆਰ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ  
 ਨਰਮੇ-ਕਪਾਹ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ (26 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 2 ਅਕਤੂਬਰ) ਹਫ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸਾਂ  
 "ਇਹ ਸਲਾਹਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ"

| ਮਿਤੀ           | ਸਤੰਬਰ            |    |      |     |     |     |     |    |    |    |    | ਅਕਤੂਬਰ          |   | ਸਲਾਹ   |
|----------------|------------------|----|------|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|-----------------|---|--|
|                | ਮੀਂਹ ਪਿਆ (ਮਿ.ਸੀ) |    |      |     |     |     |     |    |    |    |    | ਮੀਂਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ |   |  |
|                | 15to21           | 21 | 22   | 23  | 24  | 25  | 26  | 27 | 28 | 29 | 30 | 1               | 2 |  |
| <b>ਪੰਜਾਬ</b>   |                  |    |      |     |     |     |     |    |    |    |    |                 |   | ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਨਰਮਾ-ਕਪਾਹ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਰਮਾ-ਕਪਾਹ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਆਪਣੀ ਟੀਡੇ ਪੱਕਣ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਪਾਹ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਰਮਾ-ਕਪਾਹ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਰਮਾ-ਕਪਾਹ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਚੁਗਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਰਮਾ-ਕਪਾਹ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨੀ ਕਗਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨੀ ਕਗਾਰ ਨਰਮਾ-ਕਪਾਹ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਨਰਮਾ-ਕਪਾਹ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੁਗਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਰਮਾ-ਕਪਾਹ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਉੱਤੇ ਹਨੀ ਡਿਊ ਅਤੇ ਉੱਲੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਇੱਕਠਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ |
| ਬਠਿੰਡਾ         | 0.9              | 0  | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0               | 0 |  |
| ਫਿਰੋਜਪੁਰ       | 0                | 0  | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0               | 0 |  |
| ਮੁਕਤਸਰ         | 0                | 0  | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0               | 0 |  |
| ਮਾਨਸਾ          | 0                | 0  | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0               | 0 |  |
| <b>ਹਰਿਆਣਾ</b>  |                  |    |      |     |     |     |     |    |    |    |    |                 |   |  |
| ਸਿਰਸਾ          | 0                | 0  | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0               | 0 |  |
| ਹਿਸਾਰ          | 0                | 0  | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0               | 0 |  |
| ਫਤਿਹਾਬਾਦ       | 0                | 0  | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0               | 0 |  |
| <b>ਰਾਜਸਥਾਨ</b> |                  |    |      |     |     |     |     |    |    |    |    |                 |   |  |
| ਹਨੁਮਾਨਗੜ੍ਹ     | 0                | 0  | 0    | 4.3 | 2.4 | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0               | 0 |  |
|                | 0                | 0  | 0    | 0   | 6   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0               | 0 |  |
| ਬਾਸਵਾੜਾ        | 30               | 0  | 25.4 | 0   | 0.1 | 6.5 | 1.8 | 0  | 0  | 0  | 1  | 1               | 0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <p>ਇਹ ਪੱਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣ ਵਾਲੇ 4 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਖੈਰਾ, ਬਹਿਲੇਵਾਲ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨੀ ਕਗਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਬਹਿਲੇਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਟੀ. ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਉੱਤੇ ਹਰਾ ਤੇਲ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਕਗਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡੇ ਵਿੱਚ ਨਰਮਾ-ਕਪਾਹ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਆਪਣੀ ਫੁੱਲ-ਡੋਡੀ ਅਤੇ ਟੀਡੇਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ 27 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਪਿੰਡ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜਗੜ੍ਹ, ਘੁੱਦੇ, ਕਮਾਲੂ, ਮੌੜ ਕਲਾਂ, ਕੋਟਲੀ ਖੁਰਦ, ਜੋਗਾਨੰਦ, ਗਿੱਲ ਪੱਤੀ, ਬਾਗੀ ਦੀਪਾ, ਸੰਗਤ , ਘੁੱਦਾ ਅਤੇ ਬਾਜਕ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਟੀ. ਦੇ ਹਰ 1-4 ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨੀ ਕਗਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 5 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ, ਹਰਾ ਤੇਲਾ ਅਤੇ ਜੂੰ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨੀ ਕਗਾਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਰਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦੇ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਟੀਡੇਂ ਲੱਗਣ ਅਤੇ ਟੀਡੇਂ ਖਿੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੰਗਾਨਗਰ ਵਿਖੇ, ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ 3 ਪਿੰਡਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਪੂਵਾਲੀ (1 ਜੈੱਡ) , ਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਟਾ</p> |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

