

भा.कृ.अनु.प.—केंद्रीय कापूस संशोधन संस्था, नागपूर
कापसाच्या लागवडीसाठी २६ ऑक्टोबर ते १ नोव्हेंबर, २०१५ या कालावधीसाठी आठवडी
सल्ला

(५० वा मानक आठवडा)

‘‘हा सल्ला राज्यातील कृषी विद्यापीठाकडून प्राप्त माहितीवर आधारित आहे’’

हवामानासंबंधी सल्ला

		ऑक्टोबर—नोव्हेंबर मधील पाऊस (मि.मी मध्ये)							
दिनांक	२६	२७	२८	२९	३०	३१	१	सल्ला	
महाराष्ट्र									
नागपूर	○	○	○	○	○	○	○	<p>मान्सूपूर्वी पेरणी केलेला कापूस बोंड फुटण्याच्या अवस्थेत तर मान्सूनला पेरणी झालेला कापूस बोंडावस्थेत आणि जुलै महिन्यात पेरणी झालेला कापूस बोंड येण्याच्या अवस्थेत आहे. दुसऱ्यांदा कापसाला फुले येण्यास सुरुवात झाली आहे. बी.टी कापसामध्ये लाल्याचे प्रमाण आढळून आले आहे. संकरीत कापसाचे बियाणे लाल्यापासून आरक्षित असते म्हणून अशी संकरीत वाणे निवडून शेतकऱ्यांनी अशी संकरीत वाणांची लागवड करण्यापासून परावृत्त व्हावे जरी ती जास्त उत्पादन देत असतील. शेतकऱ्यांना सल्ला दिला जातो कि लाल्याची पाहणी करून दिलेल्या सल्यानुसार उपाययोजना करावी. तणांचा प्रार्दुभाव काही प्रमाणात आढळून आला आहे. पांढऱ्या माशीचा प्रार्दुभाव आढळून आला आहे. जुन—जुलै मध्ये पेरणी केलेल्या कापसामध्ये अमेरिकन बोंडअळीचे प्रमाण आर्थिक नुकसानीच्या पातळीवर गेले. हिरसुटम आणि अरबोरियम गैर बीटी कापसामध्ये आढळून आले आहे. पर्णाडागाचे प्रमाण काही भागात आढळून आले आहे. योग्य भाव मिळण्यासाठी कापसाची वेचणी व्यवस्थित रीतीने करावी. फ्लूबेन्डमाईन ची फवारणी अमेरिकन बोंडअळी नियंत्रित करण्यासाठी गैर बीटी कापसामध्ये करावी. रस शोषणाच्या किडीसाठी कोणत्याही प्रकारची फवारणी करू नये. उशीरा पेरणी झालेला कापूस जर फुलोऱ्यावस्थेत असेल तर तेव्हा २% युरिया किंवा २% डाय अमोनियम फॉस्फेट तसेच बोंडावस्थेत असेल तेव्हा १% युरिया आणि १% मॅग्नेशियम सल्फेट ची फवारणी करावी. तुरीचे अमेरिकन बोंडअळीसाठी</p>	

