

ભારતીય કૃષિ અનુસંધાન પરિષદ – કેન્દ્રીય કપાસ સંશોધન કેન્દ્ર
કપાસની ખેતી પધ્ધતિ માટે અઠવાડિક સલાહ (૨૩ થી ૩૧ ઓક્ટોબર, ૨૦૧૬)
"આ સલાહ જે તે રાજ્યની કૃષિ યુનિવર્સિટીઓ પાસેથી મળેલ માહિતી મુજબ પ્રસિધ્ધ કરેલ છે"

ખેત આબોહવા સલાહ

	વાસ્તવિક વરસાદ													ભારતીય હવામાન શાખાની આગાહી	સલાહ
	ઓક્ટોબર														
તારીખ	૧૩-૧૯	૧૯	૨૦	૨૧	૨૨	૨૩	૨૪	૨૫	૨૬	૨૭	૨૮	૨૯	૩૦		
ગુજરાત														જુનાગઢ ખાતે કપાસનો પાક જીંડવા અવસ્થાએ છે. લીલાં તડતડીયાં અને સફેદ માખી આર્થિક ક્ષમ્ય માત્રાથી વધુ નોંધાયેલ છે. બળીયાં અને ખૂણિયાં ટપકાંનો રોગ જોવા મળેલ છે. નવો સુકારો અને પાન લાલ થવાની સમસ્યા પણ જોવા મળેલ છે. સુરત ખાતે કપાસનો પાક મહત્તમ જીંડવા વિકાસની અવસ્થાએ છે. નિંદામણ નિયંત્રણ અને એક આંતર ખેડ જેવાં ખેત કાર્યોની જરૂરીયાત છે. લીલાં તડતડીયા આર્થિક ક્ષમ્ય માત્રાથી વધુ અને નોન બીટી કપાસમાં લીલી ઈયળનો ઉપદ્રવ પણ આર્થિક ક્ષમ્ય માત્રાથી વધુ નોંધાયેલ છે. સુરત ખાતેથી ભરૂચ જીલ્લાનાં ચાર ગામડાઓમાં મોજણી કરતાં કુરચણ, કેસલું, દયાદરા અને દેરોલ નાં બે-ત્રણ સ્થળો/ખેતરોમાં ફક્ત લીલાં તડતડીયા આર્થિક ક્ષમ્ય માત્રાથી વધુ નોંધાયેલ છે. જ્યારે કેસલું ખાતે એક સ્થળે ગુલાબી ઈયળ આર્થિક ક્ષમ્ય માત્રાથી વધુ નોંધાયેલ છે. ગુલાબી ઈયળનો ઉપદ્રવ હવે પછીનાં અઠવાડિયાઓમાં વધવાની સંભાવના છે. ગુલાબી ઈયળની મોજણી માટે ખેડુતોએ તાત્કાલિક ધોરણે હેક્ટર દીઠ પાંચ થી છ ફેરોમોન ટ્રેપ લગાડવા.	
અમરેલી	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦		
ભાવનગર	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦		
જામનગર	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦		
રાજકોટ	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦		
ભરૂચ	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦		
સાંબરકાંઠા	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦		
સુરેન્દ્રનગર	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦		
અમદાવાદ	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦		
વડોદરા	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦		
પાટણ	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦		
મહેસાણા	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦		

નોંધ					
વરસાદ (મીમી)	< ૫	૫-૨૦	૨૦-૫૦	૫૦-૮૦	> ૮૦

સ્ત્રોત : http://nwp.imd.gov.in/bias/dist_fcst.htm