

ಭಾ. ಕೃ. ಅ. ಪ. – ಕೇಂದ್ರೀಯ ಹತ್ತಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥಾನ, ನಾಗ್ಪುರ್

ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಸಲಹೆ, 23-29 ನವೆಂಬರ್, 2015 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ

(54 ನೇ ಪ್ರಮಾಣಿತ ವಾರ)

“ಈ ಸಲಹೆಯು ಆಯಾ ರಾಜ್ಯಗಳ ರಾಜ್ಯ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ”

ಹವಾಮಾನ ಸಲಹೆ

ದಿನಾಂಕ	ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ (ಮಿ.ಮೀ.)							ಸಲಹೆ
	23	24	25	26	27	28	29	
ಕರ್ನಾಟಕ								
ಧಾರವಾಡ	0	12	9	8	5	0	0	ಶೀತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಜಸ್ಟಿಡ್ಗಳ ಹಾವಳಿಯಿಂದ ಬಿಟೆ ಹತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲೆ ಕೆಂಪಾಗುವಿಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ರೈತರು 1% ಡಿ.ಎ.ಪಿ ಯನ್ನು ಎಲೆಗಳಿಗೆ ಸಿಂಪಡಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗುಲಾಬಿ ಕಾಯಿಕೊರಕ ಮತ್ತು ಬಿಳಿನೋಣದ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನ ಪ್ರಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹೇರಬೇಸಿಯಂ ಮತ್ತು ಆರ್ಬೋರಿಯಂ ದೇಸಿ ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಬೂದು ಶಿಲೀಂಧ್ರ ರೋಗ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ 2 ಗ್ರಾಂ ಕರ್ಬೆನ್ಡಜಿಮ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು. ಆರಂಭಿಕ ಬಿತ್ತನೆಯ ಬೆಳೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಹತ್ತಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೇರುಸಹಿತ ಕಿತ್ತು ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ದ್ವಿದಳ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದು ಹತ್ತಿ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಅನಪೇಕ್ಷಣೀಯವಾದ ನೀರಾವರಿ ಒದಗಿಸಿ ಹೊಸ ಚಿಗುರು ಪಡೆಯುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಲಭ್ಯವಿದ್ದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಲೆ ಅಥವಾ ಗೋಧಿ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಎರಡನೇ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಹತ್ತಿ ತೊಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಸುಡುವ ಬಳಸುವ ಬದಲು ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಸೂಕ್ತ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ತಯಾರಿಕೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ಅಥವಾ ಬೆಳೆಯ ಶೇಷಗಳನ್ನು ಕೊಳೆಯಿಸುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳಾದ ಫೈನರೋಫೈಟ್, ಫೈರೋತಸ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಯ ಶೇಷಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರ ಕೊಳೆಯಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದು.
ಹಾವೇರಿ	0	9	13	4	0	0	0	
ಮೈಸೂರ್	10	25	9	22	3	0	6	

ಮಾದರಿ					
ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ (ಮಿ.ಮೀ)	< 5	5-20	20-50	50-80	> 80