

భారతీయ వ్యవసాయ పరిశోధన మండలి - కేంద్ర ప్రత్తి పరిశోధన సంస్థ

ఈ వారం ప్రత్తి సాగు సలహాలు9 - 20 నవంబర్ 2016

*ప్రాంతీయ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయాల నుండి అందుకున్న సమాచారము ఆధారంగా సమీకరించబడినది.

వాతావరణ సలహాలు

	ఐ.యం.డి వారి అసలు వర్షపాతం(మి.మీ)													ఐ.యం.డి వారి ఉపించిన వర్షపాతం(మి.మీ)													సలహాలు
	నవంబర్																										
తారీకు	3to9	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	3to9	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
తెలంగాణ																										గులాబిరంగు పురుగు ఉద్యత్తి ఆర్థిక నష్టపరిధిని కొన్ని ప్రాంతాలలో దాటినది. తక్షణ చర్యగా లింగాకర్షక బుట్టలను 4-5 చొప్పున ఒక హెక్టారు పొలంలో	
ఆదిలాబాద్	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	అమర్చి, రెక్కల పురుగు యొక్క సంఖ్యను గమనించవలెను. నివారణ చర్యలను అర్థికనష్టపరిధిని దృష్టిలో ఉంచుకొని, చేపట్టవలెను. అర్థికనష్టపరిధిని	
వరంగల్	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	5	0	0	సూచించు అంశాలు ఈ క్రింద పెర్కొనవి, లింగాకర్షక బుట్టలను అమర్చిన తరువాత, 12 రెక్కల పురుగులను కనీసం రెండు లింగాకర్షక బుట్టలలో (ఒక	
ఖమ్మం	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	6	0	0	పొలంలో) ఆ విధంగా అమర్చిన మూడు రోజులలో గుర్తించినియెడల తక్షణము నివారణ చర్యలు చేపట్టవలెను. నివారణ చర్యలు ఈ క్రింద పెర్కొన వాటిలోనించి	
కరీంనగర్	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	3	0	0	పాటించవచ్చు. రెక్కల పురుగుల ఉద్యతిని తగ్గించుటకు 30 లింగాకర్షక బుట్టలు ఒక ఎకరానికి ఈ విధంగా చేసిన యెడల రాబోవు ఉద్యతిని తగ్గించవచ్చు	
నల్గొండ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	5	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	5	8	0	మరియు/లేదా ట్రికోగామా బాక్టీ అనే పరాన్నజీవి, ఇది పురుగు యొక్క గ్రుడ్డును నాశనంచేయును విడుదల చేయవలెను. ఈ పరాన్నజీవిని ICAR-NBAIR, బెంగుళూరు వారినుంచి పొంది ఉద్యతి ప్రారంభ దశలో విడుదల చేసుకొనవచ్చు. రైతు నోదరులు తరచుగ, డిసెంబర్ వరకు అక్కడక్కడ 20 మొక్కల నుంచి 20 ప్రత్తి కాయలను కోసి లార్వ ద్వారా జరుగు నష్టాని గమనించవలెను. ఒకవేళ 10-15 % శాతం నష్టాని గుర్తించినియెడల లేదా	
మహబూబ్ నగర్	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	5	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	5	6	0		

													<p>లింగాకర్షక బుట్టలను అమర్చిన తరువాత, 24 రెక్కల పురుగులను కనీసం రెండు లింగాకర్షక బుట్టలలో (ఒక పొలంలో) గుర్తించిన నివారణ చర్యలను ఈ క్రింద పెర్కొన వాటిని పాటించగలరు. అధిక సంఖ్యలో రెక్కల పురుగులను ఆకర్షించి వాటి ఉద్యుత్తిన తగ్గించుటకు 30 లింగాకర్షక బుట్టలు ఒక ఎకరానికి మరియు క్లోరిఫైరిఫాస్ (లేదా) క్వినాల్ఫాస్ తో ఒక పిచికారి నవంబర్ నెలలో మాత్రమే మరియు ఏ విధమైన ఫైరిత్రాయుడ్ పురుగు మందును డిసెంబర్ నెలలో పిచికారి చేసుకొనవలెను. డిసెంబర్ నెలలో పిచికారి మందుగా ఈ అంశాలను పరిగణంలోకి తీసుకొనవలెను. ఏ పొలాల్లో అయితే, కనీసం 8 నుంచి 10 ప్రత్తి కాయలు ఉండి, నీటి సదుపాయం కలవో అటు వంటి వారు మాత్రమే పాటించవలెను. పక్వానికి వచ్చిన ప్రత్తి కోసిన తరువాత మాత్రమే, పచ్చికాయల పైన పిచికారి చేసుకొనవలెను. అమెరికన్ కాయతొలుచు పురుగు మరియు తెల్లదోమలను దృష్టిలో ఉంచుకొని, ఫైరిత్రాయుడ్ పురుగు మందులను రైతులు వాడు కోవాలి ఎక్కువ వాడినయడల వీటి సంఖ్య పెరిగి పంటకు నష్టాని కలుగచేయును.</p>	
ఆంధ్ర ప్రదేశ్													<p>ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్ లో పలుచోట్ల పంట కాయస్థాయిలో మరియు పక్వానికి (లేదా) కోత దశకు వచ్చినది. కొన్నిచోట్ల పచ్చదోమ, తెల్లదోమలను ఉద్యుత్తిన గుర్తించడం జరిగినది వాటికి నివారణ చర్యలు కూడా చేపట్టడం</p>	
గుంటూరు	0.5	0	0	0	0	0	0	0	10	4	8	0	0	<p>గమనించడంజరిగినది. చాలా చోట్ల గులాబిరంగు పురుగు యొక్క ఉద్యుత్తిన అర్ధికనష్ట పరిధికి కంటే తక్కువగా ఉన్నట్లు గుర్తించడమైనది. రైతు సోదరులందరు కలిసిగట్టుగ, లింగాకర్షక బుట్టలను పొల్లాలో అమర్చుకోవలెను. నంద్యాలలో సర్వే చేసిన రెండు ప్రాంతాలలో (ఊర్లలో) ఉద్యుత్తి కనిపించలేదు. గుంటూరులో, సర్వే చేసిన 10 ఊర్లలో కేవలం ఒక ఊరిలో మాత్రమే నష్ట స్థాయిని గుర్తించడం జరిగినది. కాని పచ్చదోమ ఉద్యుత్తి నష్టపరచు స్థాయిలో 8 ఊర్లలో నిడముక్కల, పొన్నెకల్లు, పెద్దపరిమి, సిరిపురం, లెమల్లె, లింగాపురం, ప్రత్తిపాడు మరియు తిమ్మపురంలో 1-2 ప్రదేశాల చొప్పున గుర్తించడమైనది. తామర పురుగులు పైన పెర్కొన ఊర్లలో కనీసం ఒక్క ప్రదేశంలో</p>
ప్రకాశం	0	0	0	0	0	0	0	0	6	2	3	0	0	

