

భారతీయ వ్యవసాయ పరిశోధన మండలి - కేంద్ర ప్రత్తి పరిశోధన సంస్థ

ఈ వారం ప్రత్తి సాగు సలహాలు 14 డిసెంబర్ నుండి 20 డిసెంబర్, 2015

*ప్రాంతీయ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయాల నుండి అందుకున్న సమాచారము ఆధారంగా సమీకరించబడినది.

వాతావరణ సలహాలు

రాష్ట్రం /జిల్లా	వర్షపాతం(మి.మీ) డిసెంబర్ 2015							సలహాలు
తారీకు	14	15	16	17	18	19	20	ఆంధ్ర ప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాలలో బిటి బోల్ గార్డ్ II ప్రత్తిలో గులాబి రంగు పురుగు ఉద్యతి అధికంగా కనిపించింది. కేంద్ర ప్రత్తి పరిశోధన సంస్థ, నాగపూర్ వారి శిఫారసులను ఆర్థిక నష్టాలను నివారించడానికి తక్షణము చేపట్టాలి
తెలంగాణ								ప్రత్తి కాయలతో దూది కనిపించే దశలో (రెండవ తీతదశలో) ఉంది. రసము పిలేచ్చ పురుగులు ఆర్థిక నష్టముచేకూర్చే స్థితిలో లేవు.
ఆదిలాబాద్	3	0	4	0	0	0	0	నల్లరేగడి నెలలు: ప్రత్తి పెరుగుదల సాధారణంగా ఉంది.
వరంగల్	0	0	4	3	0	0	3	ముఖ్యంగా ప్రత్తి వైశాఖ మాసము వరకు ఉంచే ప్రాంతాలలో ప్రత్తి కాయలలో గులాబి రంగు పురుగులను గమనించవలెను.
ఖమ్మం	0	0	0	3	0	0	4	నష్టము 20% శాతానికి దాటినట్లయితే (ప్రత్తి 20 కాయలలో) తప్పని సరిగా ఫైరెథ్రాయిడ్ కీటక నాశనాలను ఉపయోగించి నియంత్రించు కొనవలెను. ప్రత్తి అవశేషలను వేసవిలో పొలములో ఉంచకుండా అతిత్వరగా నష్టపరచవలెను.
కరీంనగర్	3	0	3	3	0	0	3	
నల్గొండ	0	0	0	0	0	0	3	
ఆంధ్ర ప్రదేశ్								
గుంటూరు	0	0	0	0	0	0	0	అనంతపూర్, కర్నూల్, గుంటూరు జిల్లాలలో లింగాకర్షణ బుట్టలద్వారా(8 పురుగులు/ మూడు రాత్రులలో)/
ప్రకాశం	0	0	0	0	0	0	0	పచ్చకాయలలో గమనించి 20% శాతము నష్టానికి మించితే సస్యరక్షణ చర్యలు చేపట్టాలి. ప్రత్తి పది కాయలలో ఒక లార్వా కనిపించినట్లయితే (25-25 కాయలు ఎకరానికి) సైపర్మెత్రిన్(Cypermethrin)/ఫెన్వలరేట్(Fenevalerate) /లాండా సైహలోత్రిన్(Lamda- Cyhalothrin) మందులు వేసి

								<p>రాబోయే నష్టాలనుండి గణకృతవచ్చును. డిసెంబర్ మాసములో గులాబిరంగు పురుగు ఉద్యతి అధికంగా కనిపించును. పురుగు మందుల మిశ్రమాలను వాడకూడదు. వాడినచో తెల్లదోమ వచ్చును. దీనివలన ప్రత్తిలో అంటుకొనే తత్వము ఎక్కుగా వుంటుంది. వీలైనంత వరకు వరకు రైతులు డిసెంబర్ మాసంలో ప్రత్తిని తీసివేయాలి. తీయని పక్షంలో సస్యరక్షణ చర్యలు తప్పనిసరి.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--

సూచిక					
వర్షపాతం (మి.మీ లో)	< 5	5-20	20-50	50-80	> 80