

ଭାରତୀୟଶୁକ୍ଷି ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ-କେନ୍ଦ୍ରିୟ କ୍ଷୁଦ୍ରା ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର
କପା ଚାଷ ପାଇଁ ସାପ୍ତାହିକ କୁଷି ସୂଚନା-4th-10th ଜାନୁୟାରୀ 2015
"ଏହି କୁଷି ବାର୍ତା ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ରେ ଥିବା କୁଷି ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ ରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଉପରେ ଆଧାରିତ"

ରାଜ୍ୟ/ଜିଲ୍ଲା	ସୂଚନା
<p>ତାରିଖ</p>	<p>କପା ଫସଲ ଏବେ ଶେଷ ଅମଳ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ. ନଷ୍ଟହୋଇଥିବା ସବୁଜ ବକରା କୁ ବି.ଜି, ବି.ଜି.2 ଓ ଅଣ ବି.ଟି. କିସମରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ଓ ବିଗତ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଜମିରେ ଫସଲ ମାର୍ଚ୍ଚ ଓ ଅପ୍ରେଲ ମାସରେ ହୋଇଥିଲା ସେଥି ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟହୋଇଥିବା ସବୁଜ ବକରା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯିବା ଦରକାର.ଯଦି 20 ଟି ସବୁଜ ବକରା 20 ପ୍ରତିଶତ ନଷ୍ଟହୋଇଯାଏ ତେବେ ତୁରନ୍ତ ପାଇରିଥ୍ରାଏଡ ସିନ୍ତନ କରନ୍ତୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଅବଶିଷ୍ଟସବୁଜ ବକରା ଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟହେବାରୁ ରୋକା ଯାଇ ପରିବ.ଯଦି ଗଛ ପ୍ରତି 8 ରୁ 10 ଟି ସବୁଜ ବକରା ରେ ପାଟଳ ବକରା ବିକ୍ଷା ଯୋକ ଦେଖାଯାଏ ତା ହେଲେ ଚାଷୀ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଥର ପାଇଁ ପାଇରିଥ୍ରାଏଡ ସିନ୍ତନ କରିବା ଅବଶ୍ୟକ. ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଫୁଟି ଥିବା କପା ଅମଳ ପରେ କୀଟନାଶକ ସିନ୍ତନ କରନ୍ତୁ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଅବଶିଷ୍ଟ ସବୁଜ ବକରା କୁ ରୋଗ ଯୋକ ରୁ ଦାଉରୁ ରଖି କରାଯାଇପାରିବ. ଜାନୁୟାରୀ ମାସ ସୁଧା ଚାଷୀ ମାନେ କପା ଅମଳ ସାରି ଗଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟକରି ଦିଅନ୍ତୁ. ଅବଶିଷ୍ଟଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ରେ ଜଳ ସେଚନ ଓ ସାର ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ତେରିରେ ହୋଇଥିବା ବକାରା ଗୁଡ଼ିକରେ ପାଟଳବକାର ବିକ୍ଷା ଯୋକର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଅଧିକ ପରିମାଣ ରେ ଦେଖାଯାଇ ଥାଏ. ମୂଳୀ ଫସଲ କିମ୍ପାଖରାଟିଆ କପା ଚାଷ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ପାଟଳ ବକରା ବିକ୍ଷା ଯୋକର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଓ ବି.ଟି କପା ରେ ବକରାବିକ୍ଷା ଯୋକର ସହନଶୀଳତା ରୋକା ଯାଇ ପାରିବ. କପା ଅମଳ ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଫୁଟି ଥିବା କପାକୁ ଦିନ 10 ଟା ପରେ ଅମଳ କରନ୍ତୁ. ପ୍ରଥମେ ଅମଳ ହୋଇଥିବା କପାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସୁଖାଇ କପଡାରେ ଡିଆରି ଥଳି ରେ ପୁରାଇ ଅଲଗା ରଖନ୍ତୁ. କପା ଅମଳ ଯଥା ଶିଘ୍ର ସାରନ୍ତୁ. ଫସଲ ପର୍ଯ୍ୟାୟଦ୍ୱାରା ରୋଗ ଯୋକ ଓ ସାସ କୁ ବହୁ ପରିମାଣ ରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇ ପାରିବ. ଅମଳ ହୋଇଥିବା କପାକୁ କପାଡାରେ ଡିଆରି ଥଳିରେ ରଖନ୍ତୁ ଓ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଥଳି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ତନ୍ତୁ ର ମାନ ହ୍ରାସ ପାଇ ଥାଏ. କପା ଗଛ ର ଅବଶିଷ୍ଟ ଓ ଯୋକ ଖାଇଥିବା କପା ମନ୍ତ୍ରୀ କୁ ସନ୍ତ୍ରିତ କରି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ. ଯୋକ ଖାଇଥିବା କପା ମନ୍ତ୍ରୀ କୁ ନଷ୍ଟକରି ଦିଅନ୍ତୁ. ଶେଷ ଅମଳ ପରେ କପା ଗଛର ଅବଶିଷ୍ଟକୁ ନଷ୍ଟକରି ଦିଅନ୍ତୁ. ଶେଷ ଅମଳ ପରେ ଅବଶିଷ୍ଟଗଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ନ ଜାଲି ଏହାକୁ କାଟି ମାଟି ତଳେ ଯୋଡ଼ି କମ୍ପୋଷ୍ଟିଆରି କରନ୍ତୁ.</p>
<p>କୋରାପୁଟ</p>	
<p>କଲହାଣ୍ଡି</p>	
<p>ବଲାଶ୍ଚିର</p>	