

భారతీయ వ్యవసాయ పరిశోధన మండలి - కేంద్ర ప్రత్తి పరిశోధన సంస్థ

ఈ వారం ప్రత్తి సాగు సలహాలు 28 జూన్ నుండి 3 జూలై 2016

*ప్రాంతీయ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయాల నుండి అందుకున్న సమాచారము ఆధారంగా సమీకరించబడినది.

వాతావరణ సలహాలు

రాష్ట్రం /జిల్లా	జూన్									జూలై			సలహాలు
	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3		
ఐ.యం.డి వారి దతాంశము	అసలు వర్షపాతం(మి.మీ)						ఉహించిన వర్షపాతం(మి.మీ)						
తెలంగాణ													<p>ఈ వారంలోగా వర్షాధారము ప్రత్తిని తప్పని సరిగా విత్తు కోవాలి. ఆలస్యమైతే దిగుబడులు తగ్గిపోతాయి. విత్తుకొనే సమయంలో ఎకరానికి రెండు బస్తాలు సూపర్ ఫాస్ఫేట్, ½ బస్తా యూరియా మరియు పోటాష్ చొప్పున వేసుకొనవలెన. ఎకరాణాంతారలవలన వేసుకొనలేకపోతే తొలి గుంటక/గొర్రు(విత్తిన 15-20 రోజులు తరువాత) నడిపెటప్పుడు వేసుకొని కూలి ఖర్చులు తగించుకోవాలి. ప్రత్తి మొగ్గలు తొడిగే మరియు పూత దశలో ½ బస్తా యూరియా చొప్పున ప్రత్తి పైరుకు పైపాటుగా వేసుకోవాలి. ఆరుతడులు ఇచ్చే ప్రత్తి పైరుకు 25% వర్షాధారము ప్రత్తి కంటే అధికమైన ఎరువులు అవసరమైతాయి. రైతులు తదనుగుణంగా 2 ½ బస్తాలు సూపర్ ఫాస్ఫేట్, ½ బస్తా యూరియా మరియు పోటాష్ ను విత్తుకొనే దశలో వేసుకోవాలి. మొగ్గతొడిగే దశలో ½ బస్తా యూరియా పూత దశలో ½ బస్తా యూరియాను పైపాటుగా వేసుకోవాలి.</p>
ఆదిలాబాద్	1	5	9	11	18	10	30	25	4	10	12		
వరంగల్	0	18	5	20	1	29	35	30	8	5	12		
ఖమ్మం	0	24	8	49	17	42	50	25	15	12	14		
కరీంనగర్	0	22	7	26	8	14	35	30	6	10	15		
నల్గొండ	0	5	14	21	0	25	25	25	15	7	12		
మహబూబ్ నగర్	0	0	1	1	0	4	15	20	10	5	10		
ఆంధ్ర ప్రదేశ్													
గుంటూరు	2	11	7	17	1	2	25	20	20	5	4	<p>80మి.మీ వర్షపాతము వచ్చిన గ్రామాలలో ప్రత్తిని వెంటనే విత్తుకొనవలెను, కొన్ని గ్రామాలలో ప్రత్తి మొలిచే దశలోకూడ ఉంది. ప్రకాశము జిల్లాలలో వేసిన వేసవి ప్రత్తి శాఖీమదక నుండి కాయపగిలే వరకు వివిధ దశలలో</p>	
ప్రకాశం	0	1	5	3	0	2	15	10	10	8	4		

												<p>ఉంది. అక్టోబర్ మాసంలో ఆశించె గులాబి పురుగును దృష్టిలో ఉంచుకొని స్వల్ప మధ్య కాలిక రకాలు/సంకర జాతి ప్రత్తులను మాత్రమే విత్తుకొనవలెను.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

సూచిక					
వర్షపాతం (మి.మీ లో)	< 5	5-20	21-50	51-80	> 80

మూలం :- http://nwp.imd.gov.in/bias/dist_fcst.htm