

భారతీయ వ్యవసాయ పరిశోధన మండలి - కేంద్ర ప్రత్తి పరిశోధన సంస్థ

ఈ వారం ప్రత్తి సాగు సలహాలు 4 జూలై నుండి 10 జూలై 2016

*ప్రాంతీయ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయాల నుండి అందుకున్న సమాచారము ఆధారంగా సమీకరించబడినది.

వాతావరణ సలహాలు

జూలై -2016	వర్షపాతం(మి.మీ)										సలహాలు
	అసలు వర్షపాతం					ఉహించిన వర్షపాతం					
తారీకు	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
తెలంగాణ											<p>ఈ వారంలోగా వర్షాధారము ప్రత్తిని తప్పని సరిగా విత్తు కోవాలి. ఆలస్యమైతే దిగుబడులు తగ్గిపోతాయి. విత్తుకోసే సమయంలో ఎకరానికి రెండు బస్తాలు సూపర్ ఫాస్ఫేట్, ½ బస్తా యూరియా మరియు పోటాష్ చొప్పున వేసుకొనవలెన. ఎకరాణాంతారలవలన వేసుకొనలేకపోతే తొలి గుంటక/గొర్రు(విత్తిన 15-20 రోజులు తరువాత) నడిపెటప్పుడు వేసుకొని కూలి ఖర్చులు తగించుకోవాలి. ప్రత్తి మొగ్గలు తొడిగే మరియు పూత దశలో ½ బస్తా యూరియా చొప్పున ప్రత్తి పైరుకు పైపాటుగా వేసుకోవాలి. ఆరుతడులు ఇచ్చే ప్రత్తి పైరుకు 25% వర్షాధారము ప్రత్తి కంటే అధికమైన ఎరువులు అవసరమైతాయి. రైతులు తదనుగుణంగా 2 ½ బస్తాలు సూపర్ ఫాస్ఫేట్, ½ బస్తా యూరియా మరియు పోటాష్ ను విత్తుకోసే దశలో వేసుకోవాలి. మొగ్గతొడిగే దశలో ½ బస్తా యూరియా పూత దశలో ½ బస్తా యూరియాను పైపాటుగా వేసుకోవాలి.</p>
ఆదిలాబాద్	4	10	1	15	15	5	3	3	7		
వరంగల్	1	14	0	14	6	5	6	8	5		
ఖమ్మం	2	5	0	17	6	6	5	2	4		
కరీంనగర్	1	21	0	17	15	5	6	8	6		
నల్గొండ	2	0	0	0	4	4	6	8	4		
మహబూబ్ నగర్	1	0	0	0	5	6	8	10	2		
ఆంధ్ర ప్రదేశ్										<p>కొన్ని గ్రామాలలో ప్రత్తి మొలిచే దశలోకూడ ఉంది. ప్రకాశము జిల్లాలలో వేసిన వేసవి ప్రత్తి శాఖీమదశ నుండి కాయపగిలే వరకు వివిధ దశలలో ఉంది. అక్టోబర్ మాసంలో ఆశించే గులాబి పురుగును దృష్టిలో ఉంచుకొని స్వల్ప మధ్య కాలిక రకాలు/సంకర జాతి ప్రత్తులను మాత్రమే విత్తుకోనవలెను.</p>	
గుంటూరు	2	0	0	1	3	0	8	0	0		
ప్రకాశం	0	0	0	0	4	3	2	3	3		

సూచిక					
వర్షపాతం (మి.మీ లో)	< 5	5-20	21-50	51-80	> 80

మూలం :- http://nwp.imd.gov.in/bias/dist_fcst.htm

తెలుగు అనువాదము: డా॥ అంబటి రవీందర్ రాజు, ప్రధాన శాస్త్రవేత్త; డా॥ వి. చిన్నబాబు నాయక్, శాస్త్రవేత్త మరియు డా॥ అనురాధ నరాల, శాస్త్రవేత్త, ప్రత్తి పరిశోధన సంస్థ, నాగపూర్.