

## कापूस हंगाम 2019 – 20: साप्ताहिक पीक सल्ला

(कालावधी 16-22 सप्टे., 2019)

दिनांक	प्रत्यक्ष पाऊस (मिमी)					पडणाऱ्या पावसाचा अंदाज (मिमी)						पीक सल्ला
	सप्टेंबर					सप्टेंबर						
	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
महाराष्ट्र												
धुळे	0	0	0	0	1	33	48	28	37	36	50	<b>अकोला:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>पीक 82 दिवसांचे पात्या –फुले लागण्याच्या अवस्थेत आहे</li> <li>निंदणी, डवरणी व फवारणीची कामे सुरु आहेत.</li> <li>पावसामुळे मोठ्या प्रमाणावर तणाचा प्रादुर्भाव दिसून आला आहे.</li> <li>मध्यम स्वरूपात मावा व तुडतुडे, हिरवी व गुलाबी बोंड अळी इ. कीडीचा प्रादुर्भाव दिसून आला</li> <li>पिकाची वाढ समाधानकारक आहे.</li> </ul> <b>नांदेड</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>पीक 57-92 दिवसांचे पात्या –फुले लागण्याच्या अवस्थेत आहे.</li> <li>निंदणी, आंतरमशागत आणि पीक संरक्षणाचे उपाय सुरु आहेत.</li> <li>काही ठिकाणी मावाचा प्रादुर्भाव आर्थिक नुकसान पातळीच्या वर दिसून आला.</li> <li>काही ठिकाणी गुलाबी बोंड अळीचा प्रादुर्भाव आढळून आला.</li> <li>कुठल्याही रोगाचा प्रादुर्भाव आढळला नाही.</li> </ul> चंद्रपूरला पीक जवळपास 80 दिवसांचे आहे. तुडतुडे, पांढरीमाशी, फुलकिडे आणि मावा या किडींचा प्रादुर्भाव आर्थिक नुकसान पातळीच्या खाली दिसून आला. वर्धेला पीक 80-85 दिवसांचे आहे. तुडतुड्यांचा प्रादुर्भाव आर्थिक नुकसान पातळीच्या खाली दिसून आला.
नंदुरबार	23	4	24	1	1	28	19	28	49	90	89	
जळगाव	3	6.5	11	0	0	56	48	42	31	50	56	
अहमदनगर	0	0	2.4	2	0	20	52	31	135	71	24	
औरंगाबाद	8	0.2	1	2	0	27	31	9	0	0	6	
जालना					15	34	3	43	41	46	51	
बीड	0	5	0	30	0	48	52	30	56	30	28	
नांदेड	45	15	0	0	0	39	48	35	37	25	19	
परभणी	45.1	10.3	0	0.3	0	48	38	37	43	40	28	
हिंगोली	9	0		7		39	38	30	31	21	21	
बुलढाणा	43	0	11	0	3	44	38	35	31	44	51	
अकोला	8.9	0	15.9	4.6	0	22	33	16	35	41	18	
वाशीम	46	5	6	2	0	27	38	22	35	34	21	
अमरावती	14.8	8	8	1	4	26	50	37	36	41	20	
यवतमाळ	14.6	0	0.2	2	6	39	50	51	35	37	15	
वर्धा	3	9.6	3	1	0.6	28	50	31	22	37	7	
नागपूर	12	6.8	3.8	0.2	0.8	28	50	44	24	29	12	
चंद्रपूर	56.3	0	0	3	7	32	41	42	15	37	0	

											<p>नागपूरला पीक 80 -85 दिवसांचे आहे. तुडतुड्यांचा प्रादुर्भाव आर्थिक नुकसान पातळीच्या वर दिसून आला.</p> <p><b>पीक सल्ला:</b>  कोरडवाहू कपाशीसाठी लागवडीनंतर 30 दिवसांनी नत्र खताची 36 किलो प्रति हेक्टर याप्रमाणे व सिंचित कपाशीसाठी 60 दिवसांनी 60 किलो प्रति हेक्टर याप्रमाणे पेरणी अथवा रिंग पद्धतीने मात्रा द्यावी. युरिया 2% ची 30 दिवसांनी व डी.ए.पी. 2% ची 60 दिवसांनी पानांवर फवारणी करावी. मावा, तुडतुडे व फुलकिडे या रस शोषक किडींचा प्रादुर्भाव आर्थिक नुकसान पातळीच्या वर दिसून आल्यास बुप्रोफेझीन 25 एस सी @ 20 मिली अथवा असिटामिप्रिड 25 एस पी @ 2 ग्रम अथवा फ्लोनिकामिड 50% डबल्यू जी 4 ग्रॅ. प्रति 10 ली. पाणी याप्रमाणे फवारणी करावी. गुलाबी बोंड अळीच्या निगराणीकरिता प्रति एकरी 2 कामगंध सापळे उभारावेत. डोमकळ्या खुडून नष्ट कराव्यात. फुलोरा अवस्थेत गुलाबी बोंड अळीने आर्थिक नुकसानीची पातळी ओलांडली असेल तर नियंत्रणासाठी निंबोळी अर्क 5% किंवा मेटारझीअम एनीसोपली @ 40 ग्रॅम किंवा प्रोफेनोफोस 50 इसी @ 20 मिली प्रति 10 लिटर पाणी याप्रमाणे फवारणी करावी.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

### पाऊस (मिमी)

रंग सची

<5	5-20	21-50	51-80	>80
----	------	-------	-------	-----

0.0 मिमी हे पाऊस नाही असे सूचित करते  
रिकाम्या जागेवरील माहिती उपलब्ध नाही

स्त्रोत : <http://imdagrmet.gov.in>