

இ.வே.ஆராகு - மத்திய பருத்தி ஆராய்ச்சி நிறுவனம்

பதிந வாரம் - வாராந்திர ஆலோசனைகள்- பருத்தி பயிர் சாகுபடி

(7-13 அக்டோபர் - 2019) (42^{வது} நிலையான வாரம்)

“இங்குதரப்பட்டுள்ள அறிவுரைகள்- அந்தந்த மாநில அரசு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகங்களிலிருந்து பெறப்பட்டவை”

வானிலை ஆலோசனை

இ.வா.ஆ.து	பெய்த மழையளவு - (மி.மீ)					கணிக்கப்பட்டுள்ள மழையளவு அக்டோபர் (மி.மீ)							ஆலோசனை
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
தேதி													
மாவட்டம்	மாநிலம்					தமிழ் நாடு							
பெரம்பலூர்	0	0	0	0	0	4	0	0	0	3	6	பலபகுதியில் பருத்தி பயிரிடப்பட்டு 57 நாட்களாகி தாவர வளர்ச்சி பருவத்தில் உள்ளது. தற்போதைய வானிலை தூரிய ஒளிமிக்க மேகமூட்டமாக காணப்படுகிறது. மேலும் இடை ஊழவு மற்றும் கைகளை எடுத்து மண் அணைக்கவும். கோரை புற்கள், பார்த்தீனியம் பாதிப்பு அதிகமாக உள்ளது. தத்துப்புச்சி, அசுவினியின் மற்றும் சாறு ஊறிஞ்சும் பூச்சிகளின்தாக்குதல் பொருளாதார சேதார நிலைக்கு குறைவாக உள்ளது. பூகையிலை வரி வைரஸ் பாதிப்புகள் காணப்படுகிறது குறிப்பாக ஸ்ரீவில்லிபுதூர் பகுதியில் பருத்தி பயிரிடப்பட்டு 45 முதல் 60 நாட்களாகி தாவர வளர்ச்சி மாஸ்டரும் பூக்கும்பருவத்தில் உள்ளது.. இப்போது வானிலை மிதமான வெப்பநிலை காணப்படுகிறது.. தத்துப்புச்சி தாக்குதல் தென்படுகிறது நோய்தாக்குதல் எதுவும் இல்லை.	
சேலம்	0	0.7	2	3	1	22	25	18	14	38	28		
திருச்சி	0	0	0	0	0	8	10	9	12	19	16		
விருதுநகர்	0	0	0	0	0	5	0	7	24	34	33		
	<p>அறிவுரை: விவசாய நண்பர்கள், பருத்தி பயிரிட்ட 45 நாட்களுக்கு பிறகு முதல் கைகளை எடுக்கவும், மேலும் 60 நாட்கள் வரை வயல்களில் களை இல்லாமல் பார்த்து கொள்ளவும். வேப்பகொட்டை சாறு 5% @ 2.0 மீ.லி / லிட்டர் தெளிக்கவும். தத்துப்புச்சி, அசுவினியின் மற்றும் சாறு ஊறிஞ்சும் பூச்சிகளின்தாக்குதலை கட்டுப்படுத்த டி.நோடிப்புரன் 20 % ஏஸ் எலி 3 கி அல்லது ப்லோநிகாமிட் 50 டபிள்யூ ஜி 4 கி / 10 லிட்டர் என்ற வீதத்தில் கலந்து தெளிக்கவும். அதிகமாகக் பாதிக்கப்பட்ட பருத்தி பயிர்களை பிடுங்கி எரிக்கவும். மேலும் சாறு ஊறிஞ்சும் பூச்சிகளை கட்டுப்படுத்த குறிப்பாக இலைபேன் மேலாண்மை மிக அவசியம். இவை பூகையிலை வரி வைரஸ் பாதிப்புகள் வருவதற்கு காரணமாக உள்ளது. ஸ்ரீவில்லிபுதூர் பகுதியில் இத்தருணத்தில் இடை ஊழவு மற்றும் கைகளை எடுத்து மண் அணைக்கவும் மற்றும் இரண்டாவது தடவை மேலூரம் அளிக்கவும் பூக்கும் தருணம் மிகவும் முக்கியமான எனவே தேவையறிந்து நீர்ப்பாசனம் செய்யவும். சாறு ஊறிஞ்சும் பூச்சிகளின்தாக்குதலை கட்டுப்படுத்த ப்லோநிகாமிட் 50 டபிள்யூ ஜி 4 கி / 10 லிட்டர் என்ற வீதத்தில் கலந்து தெளிக்கவும்.</p>												

புனைவுகள்					
மழையளவு (மி.மீ)	< 5	5-20	20-50	50-80	> 80