

ભારતીય કૃષિ અનુસંધાન પરિષદ - કેન્દ્રીય કપાસ સંશોધન સંસ્થા, નાગપુર

કપાસ પુર્વાનુમાન ૨૦૧૯-૨૦ : અઠવાડિક સલાહ/માર્ગદર્શન

(સમય ગાળો : ૧૪ થી ૨૦ ઓક્ટોબર, ૨૦૧૯)

તારીખ	ખરેખર વરસાદ (મીમી) ભારતીય વેધશાળા વિભાગ					સુચિત/ પુર્વાનુમાન વરસાદ (મીમી) ભારતીય વેધશાળા વિભાગ						સલાહ/ માર્ગદર્શન
	ઓક્ટોબર					ઓક્ટોબર						
	૧૦	૧૧	૧૨	૧૩	૧૪	૧૫	૧૬	૧૭	૧૮	૧૯	૨૦	
ગુજરાત												
અમરેલી		૦	૦		૦	૦	૦	૦	૦	૦	૧૮	સુરત ખાતે કપાસનો પાક કુલ અવસ્થાએ છે. નિદામણ નિયંત્રણના કાર્યો અને આંતરખેડના કાર્યો કરવામા આવેલ છે. લીલા તડતડીયાનો ઉપદ્રવ આર્થિક ક્ષમ્ય માત્રાથી વધુ નોંધાયેલ છે. કેટલાક ખેતરોમાં બેક્ટેરીયાથી થતા પાનનાં બળીયા ટપકાનો રોગ જોવા મળેલ છે.
ભાવનગર		૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૬	
જામનગર	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	
રાજકોટ		૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	
ભરૂચ	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૧૮	સલાહ :
સાબરકાંઠા				૦		૦	૦	૦	૦	૦	૦	યુસિયા પ્રકારનીજાતોનાં નિયંત્રણ માટે એસીટામીપ્રીડ @ ૦.૨ ગ્રામ અથવા બુપ્રોફેઝીન ૨૫ ઇસી @૧.૨૫ મીલી અથવા ડાયાફેન્થ્યુરોન ૫૦ ડબલ્યુ પી @ ૧.૨ ગ્રામ અથવા ફ્લોનીકામીડ ૫૦ ડબલ્યુજી @ ૦.૪ ગ્રામ પ્રતિ લી. પાણી પ્રમાણે છંટકાવ કરવો. ગુલાબી ઇયળની મોજણી માટે લગાડેલ ૫ ફેરોમોન ટ્રેપ પ્રતિ હે. મુજબના ટ્રેપમાં નર કુદાની સંખ્યા આર્થિક ક્ષમ્ય માત્રા (સતત ૩ દિવસ સુધી સરેરાશ ૮ કુદા પ્રતિ ફેરોમોન ટ્રેપ) વટાવે ત્યારે થાયોડીકાર્બ ૭૫ ડબલ્યુપી @ ૨૦ ગ્રામ અથવા ક્વીનાલ્ફોસ ૨૦ એએફ @ ૨૫ મીલી અથવા ક્લોરપાયરીફોસ ૨૦ ઇસી @ ૨૫ મીલી પ્રતિ ૧૦ લી. પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો. બંધ પાંખડીવાળા "રોઝેટ ફલાવર" નો ઇયળ સહિત તોડીને નાશ કરવો. બેક્ટેરીયાથી થતા બળીયા ટપકાનો રોગના નિયંત્રણ માટે સ્ટ્રેપ્ટોસાયકલીન ૧ ગ્રામ + કોપર ઓક્સીક્લોરાઇડ ૨૫ ગ્રામ પ્રમાણે ૧૦ લી પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો.
સુરેન્દ્રનગર		૦	૦		૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	
અમદાવાદ		૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	
બરોડા		૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૧૩	
પાટણ						૦	૦	૦	૦	૦	૦	
મહેસાણા						૦	૦	૦	૦	૦	૦	

વરસાદ (મીમી) પ્રમાણિત રંગ	< ૫	૫-૨૦	૨૧-૫૦	૫૧-૮૦	> ૮૦
------------------------------	-----	------	-------	-------	------

૦.૦ મીમી વરસાદ (વરસાદ નથી).

ખાલી જગ્યા દર્શાવે છે કે આંકડાઓ ઉપલબ્ધ નથી.

સ્ત્રોત : <http://imdagrmet.gov.in>