

ಭಾ. ಕೃ. ಅ. ಪ. – ಕೇಂದ್ರೀಯ ಹತ್ತಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥಾನ, ನಾಗ್ಪುರ್

ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಸಲಹೆ, 6-12 ಅಕ್ಟೋಬರ್, 2015 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ

(47 ನೇ ಪ್ರಮಾಣಿತ ವಾರ)

“ಈ ಸಲಹೆಯು ಆಯಾ ರಾಜ್ಯಗಳ ರಾಜ್ಯ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ”

ಹವಾಮಾನ ಸಲಹೆ

ದಿನಾಂಕ	ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಿನ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ (ಮಿ.ಮೀ.)							ಸಲಹೆ
	6	7	8	9	10	11	12	
ಕರ್ನಾಟಕ								
ಧಾರವಾಡ	11	7	11	5	8	28	5	ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಲವಾರು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ವಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ವರದಿಯಾಗಿದೆ(>70 ಮಿ.ಮೀ). ನೀರಿನ ಸ್ಥಗಿತವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ನಿಂತ ನೀರನ್ನು ಒಳ ಚರಂಡಿ ಮೂಲಕ ಹರಿಸಬೇಕು, ಇದರಿಂದ ಬೀಜಕೋಶ ಬೀಳುವಿಕೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ 25 ಕೆ ಜಿ ಯೂರಿಯ ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನೈರ್ಮಲ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ರೋಗದ ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಬೀಜಕೋಶಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹೂತುಹಾಕಬೇಕು ಅಥವಾ ಸುಡಬೇಕು. ಗುಲಾಬಿ ಕಾಯಿಕೊರಕದ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಸೂಕ್ತ ಸಸ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ದೇಸಿ ಹತ್ತಿ ತಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ 30 ಕೆ ಜಿ ಯೂರಿಯ ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಹತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲೆ ಕೆಂಪಾಗುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಮೊಗ್ಗು ಬೀಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು, 1% 19:19:19 ಕರಗುವ ರಸಗೊಬ್ಬರದ ಜೊತೆ 1% MgSO ₄ ಮತ್ತು ಫ್ಲನೊಫಿಕ್ಸ್ (15ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ 5 ಮಿ.ಲೀ ಸೇರಿಸಿ) ನ್ನು 15 ದಿನಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು. ಮಿಡ್ ಮತ್ತು ಮಿರಿಡ್ ಹಾವಳಿಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ಅರ್ಥಿಕ ಮಟ್ಟ ದಾಟಿದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಸ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಹಾವೇರಿ	13	16	16	12	8	7	7	
ಮೈಸೂರ್	50	33	10	12	33	11	0	

ಮಾದರಿ					
ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ (ಮಿ.ಮೀ)	< 5	5-20	20-50	50-80	> 80