

పత్తి సాగుకు 18వ వారపు సలహా 21 – 27 అక్టోబర్, 2019

	అసలువర్షపాతం (మి.మీ) (ఐ.యం.డి)					అంచనావర్షపాతం (ఐ.యం.డి)						సలహా
	సెప్టెంబర్					సెప్టెంబర్						
తారీకు	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
తెలంగాణ												
ఆదిలాబాద్	0	7	6.8	4	1.4		7	26	19	32	32	<p>పంట కాయ దశలో వుంది. వాతావరణం మేఘావృతమై వర్షంతో కూడుకున్నది. పొలాల నుండి అదనపు నీటిని తీసి వేయడం జరిగింది. నిరంతర వర్షాల వల్ల కలుపు పెరుగుదల గుర్తించబడింది. పచ్చదోమ ఉద్యతి(ETL) ఆర్థిక మితి స్థితి కంటే ఎక్కువ గమనించడమైనది. దీనికోసం మోనోక్రోటోఫాస్ 36SL @ 1.6 మి.లీ/లీ లేదా అసిఫెట్ 75 SP @ 1.5 గ్రా/లీ లేదా ఫిప్రోనిల్ 5SC @ 2 మి.లీ/లీ లేదా ఇమిడాక్లోప్రిడ్ 17.8 SL @ 0.4 మి.లీ/లీ లేదా అసిటామిప్రిడ్ 20 SC @ 0.2గ్రా/లీ లేదా Thiamethoxam 25 WG @ 0.2గ్రా /లీ లేదా ఫ్లోనికామిడ్ 0.3గ్రా /లీ లేదా డైఫెన్థియూరాన్ @ 1.25 గ్రా/లీ సిఫారిస్సు చేయబడింది. నిరంతర మరియు భారీ వర్షాలు కురిసిన కొన్ని ప్రాంతాల్లో వేరు కుళ్ళు మరియు వేరు ఎండు తెగులు నమోదయ్యాయి. ఆకు మచ్చల తెగులు తక్కువ నుండి మితమైన తీవ్రతతో గమనించబడింది.</p> <p>నంద్యాలలో పంట 63 నుండి 120 రోజులు వయస్సుతో కాయ దశలో ఉంది. వాతావరణం పొడిగా వెలుతురుతో కూడు ఉంది. కలుపు తీయటం మరియు అంతరకృషి చేపట్టారు. గడ్డి మరియు వేడలాప్పు కలుపు మొక్కలు గుర్తించబడ్డాయి.</p>
వరంగల్	3	2	76	17	12		8	13	34	46	30	
ఖమ్మం	0	6	0	1	13		18	23	25	22	14	
కరీంనగర్	0	1.2	8.8	22.8	4		7	27	25	38	45	
మహబూబ్ నగర్	8.8	0.2	0.2		7.0		11	30	89	42	52	
ఆంధ్రప్రదేశ్												
గుంటూరు	1	2.2	52.8			23	23	63	32	37	28	
ప్రకాశం	47	21	21.3	65.4	26.6	29	29	48	41	36	42	

రసం పిలచ్చుపురుగులైన పచ్చదోమ ETL కంటే ఎక్కువ. పెనుబంక, తెల్లదోమ ETL కంటే తక్కువ గుర్తించడమైనది. పువ్వులలో గులాబి రంగు పురుగు ముట్టడి ETL కంటే తక్కువ నమోదయింది. పిండినల్లి ఉధృతి గ్రేడ్-1 డ్యుమేజ్ మరియు Alternaria ఆకు మచ్చ తెగులు కూడా గుర్తించబడింది.

సలహా:

రసం పీల్చు పురుగుల నివారణకు Thiamethoxam 25 WG @ 2గ్రా /లీ లేదా ఫ్లోనికామిడ్ 50 WG @ 4గ్రా /10లీ కలిపి పిచికారి చేయాలి. గులాబిరంగు పురుగు నివారణకు లింగాకర్షణ బుట్టలు ఒక ఎకరాకు 2 పెట్టి, అదుపులోకి రాకపోతే వేప నూనె @ 5 మి.లీ లేదా థయోడికార్బ్ @ 1.5గ్రా లేదా ప్రోఫెనోఫాస్ @ 2 మి.లీ/లీ నీటిలో కలిపి పిచికారి చేయాలి. ఆకు మచ్చల నివారణ కోసం 10 లీటర్లు నీటిలో కార్బండిజిమ్ 50 WP 10g లేదా ఫైరక్లోస్ట్రోబిన్ 20 WG 10g పిచికారి చేయాలి. వేరు కుళ్ళు ప్రభావిత మరియు చుట్టు పక్కల పత్తి మొక్కల కోసం 0.3% copper oxychloride 50 WP తో నేల తడిపి వేయుడం చేయాలి.

వర్షపాతం
(మి.మీ)



0.0వర్షపాతం మి.మీ (వర్షపాతం లేదు)
ఖాళీ స్పేస్ - డేటాఅందుబాటులో లేదు
మూలం : <http://imdagrmet.gov.in>