ભારતીય કૃષિ અનુસંધાન પરિષદ – કેન્દ્રીય કપાસ સંશોધન સંસ્થા, નાગપુર

કપાસ પુર્વાનુમાન ૨૦૧૯-૨૦ : અઠવાડિક સલાહ/માર્ગદર્શન

(સમય ગાળો : ૨૮ ઓકટોબર થી ૩ નવેમ્બર, ૨૦૧૯)

	ખરેખર વરસાદ (મીમી) ભારતીય વેધશાળા વિભાગ					સુચિત/ પુર્વાનુમાન વરસાદ (મીમી) ભારતીય વેધશાળા વિભાગ						સલાહ/ માર્ગદર્શન
	ઓક્ટોબર					ઓક્ટોબર- નવેમ્બર						
તારીખ	૨૪	૨૫	૨૬	૨૭	૨૮	૨૯	૩૦	૩૧	૧	૨	૩	
ગુજરાત												
અમરેલી	૧	૦	૦			૫	૧૦	૨૩	૩	૧૮	૨૮	જુનાગઢ ખાતે કપાસનો પાક ફુલ અને જીંડવા ખુલવાની અવસ્થાએ છે. કિટનાશક દવાનો છંટકાવ થયેલ છે. થ્રીપ્સ, લીલા તડતડીયા અને સફેદ માખીનો ઉપદ્રવ આર્થિક ક્ષમ્ય માત્રાથી ઓછો નોંધાયેલ છે. કોરીનોસ્પોરા થી થતા પાનનાં ટપકા અને પાનના બળીયાનો ઉપદ્રવ વધુ પ્રમાણમાં છે. **સલાહ** : કપાસના ખેતરોમાં જ્યાં ફુલ અવસ્થા જોવા મળેલ છે ત્યાં એમોનિયમ સલ્ફેટ અથવા યુરીયા જમીનમાં આપવુ અથવા પોટેશીયમ નાઇટ્રેટ ૧૩-૦-૪૫ એન.પી.કે. પ્રવાહી ખાતરનો ૨% (૨૦૦ ગ્રામ પ્રતિ ૧૦ લી. પાણી) પ્રમાણે છંટકાવ કરવો. છોડના ટોચના ફુગથી થતા રોગોના નિયત્રણ માટે મેટીરામ ૫૫% + પાયરોક્લોસ્થોબીન ૫% ડબલ્યુજી ૨૦ ગ્રામ અથવા કાર્બેન્ડેઝીમ ૫૦% ડબલ્યુપી @ ૧૦ ગ્રામ પ્રતિ ૧૦ લી. પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો. બેકટેરીયાથી થતા બળીયા ટપકાનો રોગના નિયંત્રણ માટે કોપર ઓક્ઝીક્લોરાઇડ ૨૫ ગ્રામ + સ્ટ્રેપ્ટોસાયકલીન ૧ ગ્રામ પ્રમાણે ૧૦ લી પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો. ચુસિયા પ્રકારની જીવાતોનાં નિયંત્રણ માટે થાયોમીથોક્ઝામ ૨૫ ડબલ્યુજી ૨ ગ્રામ અથવા ફ્લોનીકામીડ ૫૦ ડબલ્યુજી @ ૪ ગ્રામ પ્રતિ ૧૦ લી. પાણીમાં ભેળવી જે તે જીવાતોની આર્થિક ક્ષમ્ય માત્રાએ છંટકાવ કરવો. ગુલાબી ઇયળની મોજણી માટે ૫ ફેરોમોન ટ્રેપ પ્રતિ હે. મુજબ લગાડવા.
ભાવનગર	૦	૦	૦	૦.૨	૦	૫	૧૦	૨૩	૭	૬	૨૧	
જામનગર	૦	૦				૦	૨૦	૬	૨૧	૪૦	૬	
રાજકોટ	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૨૪	૪	૯	૬૦	૨૩	
ભરૂચ	૦	૦				૧૨	૧૩	૪	૭	૧૮	૧૬	
સાબરકાંઠા						૨૮	૧૩	૪	૦	૨૩	૧૨	
સુરેન્દ્રનગર	૦	૦	૦	૦	૦	૧૨	૨૪	૪	૯	૩૫	૨૩	
અમદાવાદ	૦	૦	૦	૦	૦	૯	૧૬	૦	૯	૧૬	૧૩	
બરોડા	૦	૦	૦	૩	૦	૩૧	૨૭	૨૩	૨૨	૩૧	૩૫	
પાટણ						૨૫	૭	૦	૧૧	૨૮	૪	
મહેસાણા						૩૧	૮	૦	૭	૨૩	૪	

વરસાદ (મીમી) પ્રમાણિત રંગ	< ૫	૫-૨૦	૨૧-૫૦	૫૧-૮૦	> ૮૦

૦.૦ મીમી વરસાદ (વરસાદ નથી).

ખાલી જગ્યા દર્શાવે છે કે આંકડાઓ ઉપલબ્ધ નથી.

સ્ત્રોત : http://imdagrimet.gov.in