

ಕೇಂದ್ರೀಯ ಹತ್ತಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥಾನ, ನಾಗಪುರ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ

[ಭಾರತೀಯ ಕೃಷಿ ಅನುಸಂಧಾನ ಪರಿಷತ್ (ಭಾ. ಕೃ. ಅ. ಪ.), ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ರೈತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ]

ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಸಲಹೆ, ನವೆಂಬರ್ 4 ರಿಂದ 10, 2019 ರವರೆಗೆ

ದಿನಾಂಕ	ಅಕ್ಟೋಬರ್-ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನ ವಾಸ್ತವಿಕ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ. ಮಿ .ಮೀ ನಲ್ಲಿ (IMD ಆಧಾರಿತ)			ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಮಿ .ಮೀ ನಲ್ಲಿ (IMD ಆಧಾರಿತ)						ಸಲಹೆ				
	31	1	2	3	4	6	7	8	9		10			
	ಕರ್ನಾಟಕ													
ಧಾರವಾಡ	0	1	0	0	1.6	25	23	0	0	0	<p>ಧಾರವಾಡ ಮತ್ತು ಹತ್ತಿರದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ ಬೆಳೆಯು 120 ದಿನಗಳಾಗಿದ್ದು ಕಾಯಿ ಬಿಡುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ತಡವಾಗಿ ಬಿತ್ತಿದ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರಜನಕ ಮತ್ತು ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಎಲೆಗಳ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಕಳೆದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದೆ ಮಧ್ಯಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜಾಸಿಡ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದವು. ಹಾವೇರಿ ಮತ್ತು ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಿರಿಡ್ ದೋಷ ಆರ್ಥಿಕ ಮಿತಿ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಗುಲಾಬಿ ಕಾಯಿಕೊರಕಗಳಿಂದ ಹತ್ತಿ ಕಾಯಿಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿವೆ ಆದರೆ ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ಮಿತಿ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಎಲೆ ರೋಗ ಮತ್ತು ಬೋಲ್ ಕೊಳೆತ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಸಂಭವವು ಮಧ್ಯಮದಿಂದ ತೀವ್ರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.</p> <p>ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ 71 ರಿಂದ 177 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹತ್ತಿ ತೆಗೆಯುವುದು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಗಿಡಹೇನುಗಳು (4 ರಿಂದ 5/3 ಎಲೆಗಳು), ಜಾಸಿಡ್ (3 ರಿಂದ 4/3 ಎಲೆಗಳು) ಮತ್ತು ಮಿರಿಡ್ ದೋಷಗಳು (25 ಚೌಕಗಳಿಗೆ 4-5) ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 18 ರಿಂದ 20% ರಷ್ಟು ಗುಲಾಬಿ ಬೋಲ್ ವರ್ಮ್ ಸಂಭವವನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ</p> <p>ಸಲಹೆ:</p> <p>ತಡವಾಗಿ ಬಿತ್ತಿದ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಸಾರಜನಕ ಮತ್ತು ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಎಲೆಗಳಿಗೆ ಸಿಂಪಡಿಸಲು ರೈತರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.</p> <p>ಕೀಟ ಮತ್ತು ರೋಗಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">ಡ್ರಿಪ್ ನುಸಿ</td> <td style="width: 5%;">:</td> <td style="width: 45%;">ಫಿಪ್ರೋನಿಲ್ 5 ಎಸ್‌ಸಿ @ 1 ಮಿಲಿ/1 ಲೀಟರ್</td> </tr> </table>	ಡ್ರಿಪ್ ನುಸಿ	:	ಫಿಪ್ರೋನಿಲ್ 5 ಎಸ್‌ಸಿ @ 1 ಮಿಲಿ/1 ಲೀಟರ್
ಡ್ರಿಪ್ ನುಸಿ	:	ಫಿಪ್ರೋನಿಲ್ 5 ಎಸ್‌ಸಿ @ 1 ಮಿಲಿ/1 ಲೀಟರ್												
ಹಾವೇರಿ					0	15	20	0	0	0				
ಮೈಸೂರ್	5	0	0	0	0	13	25	52	61	64				

