

**இ.வே.ஆரா.கு - மத்திய பருத்தி ஆராய்ச்சி நிறுவனம்**

இருபதாவது வாரம் - வாராந்திர ஆலோசனைகள்- பருத்தி பயிர் சாகுபடி

(4 – 10 நவம்பர்- 2019) (46 வது நிலையான வாரம்)

“இங்குதரப்பட்டுள்ள அறிவுரைகள்- அந்தந்த மாநில அரசு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகங்களிலிருந்து பெறப்பட்டவை”

**வானிலை ஆலோசனை**

இ.வா.ஆ.து	பெய்த மழையளவு - நவம்பர் (மி.மீ)					கணிக்கப்பட்டுள்ள மழையளவு நவம்பர் (மி.மீ)					ஆலோசனை
	31	1	2	3	4	6	7	8	9	10	
தேதி	31	1	2	3	4	6	7	8	9	10	
மாவட்டம்	மாநிலம்					தமிழ் நாடு					
பெரம்பலூர்	0	12	0	0	0	0	16	33	66	3	<p>ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் பகுதியில் பருத்தி பயிரிடப்பட்டு 75 முதல் 90 நாட்களாகி காய் வளர்ச்சி பருவத்தில் உள்ளது. தேவையான இடங்களில் கைகளை எடுத்து களையற்ற வயலாக இருப்பது அவசியம். புள்ளிகாய்ப்புழு மற்றும் சாறு உறிஞ்சும் (வெள்ளை ஈ; தத்துப்பூச்சி, இலைபேன்) பூச்சிகளின்தாக்குதல் பொருளாதார சேதார நிலைக்கு குறைவாக உள்ளது. பருத்தி கூண் வண்டு மற்றும் வேர் அழுகல் நோய்தாக்குதல் காணப்படுகிறது</p>
சேலம்	3	0.7	0	0	0	0	15	26	71	20	
திருச்சி	0	0	0	0	0	0	19	33	79	23	
விருதுநகர்	0	0	0	0	0	7	8	18	31	36	
<p><b>அறிவுரை:</b> அதிக மழை கடந்த சில நாட்களாக பெய்த காரணத்தால் தேவையற்ற நீர் வயல்களில் வடிவதற்கு விவசாய நண்பர்கள் நல்ல வடிகால் வசதி செய்யவும். மேலும் நீர்ப்பாசனம் செய்ய கூடாது. புள்ளிகாய்ப்புழுவினை கட்டுப்படுத்த எம்மேக்டின் பென்சோயேட் 5 எஸ் ஜி @ 2.5 கி/ 10 லிட்டர் நீரில் என்ற வீதத்தில் கலந்து தெளிக்கவும். மேலும் சாறு உறிஞ்சும் பூச்சிகளின் பாதிப்புகள் பொருளாதாரசேதார நிலைக்கு அதிகமாகக் காணப்பட்டால், அதனை கட்டுப்படுத்த இமிடாகுளோபிரிட் 17.8 எஸ்எல் @ 3 மீ லி / 10 லிட்டர் அல்லது பிலோணிகமிட் 50 டபிள்யூஜி @ 4 கி அல்லது டைபின்தீயூரான் 20 எஸ்பி @ 3 கி/ 10 லிட்டர் கலந்து தெளிக்கவும். மேலும் பருத்தி கூண் வண்டு மற்றும் வேர் அழுகல் நோய்தாக்குதல் கட்டுப்படுத்த குளோர்பைரிஹாஸ் 20 ஈஸி at 20 மீ லி / 10 லிட்டர் + கார்பெண்டசிம் 50 டபிள்யூ பி @ 10 கி/ 10 லிட்டர் கலந்து வேர்ப்பகுதியில் ஊற்றவும்.</p>											

புனைவுகள்					
மழையளவு (மி.மீ)	< 5	5-20	20-50	50-80	> 80