

कापूस हंगाम 2019 – 20: साप्ताहिक पीक सल्ला
(कालावधी: 11 नोव्हेंबर– 17 नोव्हेंबर, 2019)

महिना	प्रत्यक्ष पाऊस (मिमी)					पडणाऱ्या पावसाचा अंदाज (मिमी)					पीक सल्ला	
	नोव्हेंबर					नोव्हेंबर						
	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
महाराष्ट्र												
धुळे		0			0	0	0	0	0	0		
नंदुरबार		0			0	0	0	0	0	0		
जळगाव	6.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
अहमदनगर	0	0		0	0	7	0	0	3	0		
औरंगाबाद	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
जालना	0	0		0		0	0	0	0	0		
बीड	0	0	0	0	0	3	0	0	3	0		
नांदेड	3		0	0	0	0	0	0	0	0		
परभणी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
हिंगोली						0	0	0	0	0		
बुलढाणा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
अकोला	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
वाशीम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
अमरावती	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
यवतमाळ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
वर्धा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
नागपूर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
चंद्रपूर											0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

- पीक 135-160 दिवसांचे असून बोंडे विकसित होण्याच्या ते बोंडे उमलण्याच्या अवस्थेत आहे
- कापूस वेचणी चालू आहे
- काही भागात गुलाबी बोंड अळी चा प्रादुर्भाव आर्थिक नुकसानीच्या वर आढळला
- काही ठिकाणी जिवाणूजन्य करपा व दहिया रोगाचा (ग्रे मिल्ड्यू) प्रादुर्भाव आढळला
- नांदेड, हिंगोली, परभणी, बीड आणि अहमदनगर जिल्ह्यातील बहुतेक कपाशीवर दहिया रोगाचा (ग्रे मिल्ड्यू) प्रादुर्भाव आहे. कोरीनेस्पोरा, मायरोथेसिम आणि सर्कोस्पोरा बुरशीचे ठिपके सुद्धा कमी ते मध्यम स्वरूपात आढळून आले आहेत. तसेच परतीच्या पावसामुळे मराठवाड्यात बोंडावर अँथ्रॅकनोज रोगाचा प्रादुर्भाव दिसून आला.

पीक सल्ला:

- गुलाबी बोंडअळीच्या निगराणीसाठी कामगंध सापळे उभारावेत
- जर गुलाबी बोंड अळीने आर्थिक नुकसानीची पातळी ओलांडली (8-10 पतंग प्रती दिवस) किंवा 10% प्रादुर्भावग्रस्त हिरव्या बोंडात जिवंत गुलाबी बोंडअळी असेल तर फेनवलेट 20% ई.सी. 10 मिली किंवा सायपरमेथ्रीन 10% ई.सी. 10 मिली किंवा लॅमडा सायहॅलोथ्रीन 5% EC ई.सी. 10 मिली प्रती 10 लिटर पाणी याप्रमाणे प्रती झाड 8 हिरवी बोंडे असेल तर फवारणी करावी
- पानांवरील आणि बोंडावरील बुरशीजन्य रोगांच्या व्यवस्थापनासाठी कार्बेन्डाझिम 50% डब्लू. पी. 10 ग्रॅम, मेटेरायम 55+पायराक्लोस्ट्रोबीन 5% डब्लू. जी. @ 20 ग्रॅम किंवा पायराक्लोस्ट्रोबीन 20% डब्लू. जी. 10 ग्रॅम प्रति 10 लिटर पाण्यात मिसळून पिकावर फवारणी करावी

