कापूस हंगाम 2019 – 20: साप्ताहिक पीक सल्ला

(कालावधी: 25 नोव्हेंबर– 1 डिसेंबर, 2019

महिना	प्रत्यक्ष पाऊस (मिमी)					पडणाऱ्या पावसाचा अंदाज (मिमी)						पीक सल्ला
	नोव्हेंबर					डिसेंबर						
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	
महाराष्ट्र												
धुळे	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**नांदेड:** • पीक 148-170 दिवसांचे असून बोंडे विकसित होण्याच्या ते बोंडे उमलण्याच्या अवस्थेत आहे • अहवालाच्या कालावधीत हवामान सामान्य होते • विदर्भ आणि मराठवाड्यातील काही भागात गुलाबी बोंडअळीचा प्रादुर्भाव आर्थिक नुकसान पातळीच्या वर आढळला • कोरायनेस्पोरा पानांवरील ठिपके, अँथ्रॅकनोज व दहिया रोगाचा (ग्रे मिल्ड्यू) प्रादुर्भाव विदर्भ आणि मराठवाड्यातील बहुतेक भागात दिसून आला • हवामान निरभ्र होते • कापूस वेचणी चालू आहे **पीक सल्ला:** • गुलाबी बोंडअळीच्या पतंगाच्या निगराणीसाठी प्रती एकर 2 कामगंध सापळे उभारावेत • जर गुलाबी बोंड अळीने आर्थिक नुकसानीची पातळी ओलांडली (8-10 पतंग प्रती रात्री असे सतत तीन रात्री) असेल तर पतंग मोठ्या प्रमाणात पकडण्यासाठी 8 कामगंध सापळे प्रती एकर प्रमाणे शेतात उभारावेत • गुलाबी बोंडअळीच्या निरीक्षणासाठी आठवड्यातून एकदा प्रति एकर 20 झाडांची सुमारे 20 हिरवी बोंडे विच्छेदन करण्याचा सल्लाही शेतकऱ्यांना देण्यात आला आहे • जर गुलाबी बोंड अळीने आर्थिक नुकसानीची पातळी ओलांडली (तीन दिवसात सरासरी 24
नंदुरबार	1	2	2	30	4	0	0	0	0	0	0	
जळगाव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
अहमदनगर	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
औरंगाबाद	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
जालना	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
बीड			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
नांदेड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
परभणी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
हिंगोली						0	0	0	0	0	0	
बुलढाणा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
अकोला	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
वाशीम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
अमरावती	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
यवतमाळ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
वर्धा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
नागपूर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
चंद्रपूर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

												पतंग प्रती सापळा) किंवा 10% प्रादुर्भावग्रस्त हिरव्या बोंडात जिवंत गुलाबी बोंडअळी असेल तर थायोडीकार्ब 75 डब्लू.पी. 20 ग्रॅम किंवा क्विनॉलफॉस 20 ए.एफ. 25 मिली किंवा क्लोरपायरिफॉस 20% ई.सी. 25 मिली किंवा फेनवलरेट 20% ई.सी. 10 मिली किंवा सायपरमेथ्रीन 10% ई.सी. 10 मिली किंवा लॅमडा सायहॅलोथ्रीन 5% EC ई.सी. 10 मिली प्रती 10 लिटर पाणी याप्रमाणे प्रती झाड 8 हिरवी बोंडे असेल तर फवारणी करावी • पानांवरील बुरशीजन्य रोगांच्या व्यवस्थापनासाठी पायराक्लॉस्ट्रोबीन 20% डब्लू.जी. 10 ग्रम किंवा कार्बेन्डाझिम 50% डब्लू. पी. 10 ग्रॅम किंवा क्रेसोझिम- मिथिल 44.3 % एस.सी. 10 मिली किंवा मेटीराम 55+पायराक्लॉस्ट्रोबीन 5% डब्लू.जी. @ 20 ग्रम प्रति 10 लिटर पाण्यात मिसळून पिकावर फवारणी करावी

पाऊस (मिमी)

रंग सुची

<5	5-20	21-50	51-80	>80

0.0 मिमी हे पाऊस नाही असे सूचित करते

रिकाम्या जागेवरील माहिती उपलब्ध नाही

स्त्रोत : http://imdagrimet.gov.in