

ਆਈ.ਸੀ.ਏ.ਆਰ: ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਨਰਮੇ-ਕਪਾਹ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ (9 ਤੋਂ 14 ਜੁਲਾਈ, 2019) ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਇਹ ਸਲਾਹਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

	ਮੀਂਹ ਪਿਆ					ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ						ਸਲਾਹ
	ਜੁਲਾਈ					ਜੁਲਾਈ						
ਮਿਤੀ	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	
ਪੰਜਾਬ												
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ						0	0	0	0	0	7	ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਫਸਲ ਲੱਗਭੱਗ 57 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫਸਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਗੋਡੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਖਾਦ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੂ ਦੀ ਦਰ ਆਰਥਿਕ ਕਗਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਛਿੜਕਾਅ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਗਾ ਦੇਣ। ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਰਥਿਕ ਕਗਾਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਹਮਲਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਫਰੀਦਕੋਟ	0	0	0			0	0	0	0	0	3	
ਮੁਕਤਸਰ						0	0	0	0	0	0	
ਬਠਿੰਡਾ	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	
ਸੰਗਰੂਰ						6	0	0	0	0	5	
ਲੁਧਿਆਣਾ								0	0	14		5 ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਫਸਲ 40 ਤੋਂ 55 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫਸਲ ਦੀ ਗੋਡਾਈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਕਿਸਤ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 0-8 ਪ੍ਰਤੀ ਤਿੰਨ ਪੱਤੇ, ਹਰੇ ਤੇਲੇ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 0-4 ਪ੍ਰਤੀ ਤਿੰਨ ਪੱਤੇ ਅਤੇ ਜੂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 0-10 ਪ੍ਰਤੀ ਤਿੰਨ ਪੱਤੇ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਫਸਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਲਾਹ: ਜੇਕਰ ਰਸ ਚੂਸਣ ਵਾਲੇ ਕੀੜਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਆਰਥਿਕ ਕਗਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿੰਮ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ 5 ਮਿਲੀਲਿਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੱਧ ਰਹੀ ਨਮੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀੜੇ ਮਕੋੜਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੁਚੱਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਸਲ ਦੀ ਗੋਡੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਅਤੇ ਤੇਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਪੀਲੇ ਕਾਰਡ ਲਗਾਓ। ਗਰਮ ਅਤੇ ਸਿੱਲੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਤੇਲੇ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ												
ਹਿਸਾਰ	0	0				0	0	0	0	0	0	ਹਿਸਾਰ ਵਿਖੇ ਫਸਲ ਲੱਗਭੱਗ 64-84 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਖਾਦ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸਤ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ

ਜੀਦ					9	3	5	0	0	0	<p>ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦੇ ਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਰਥਿਕ ਕਗਾਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤੇਲੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਕਗਾਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੂ ਦੀ ਔਸਤਨ ਗਿਣਤੀ 1.3-3.9 ਪ੍ਰਤੀ ਪੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਬੂਟਿਆਂ ਤੇ ਮਿਲੀਬੱਗ ਦਾ ਹਮਲਾ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਲਟ, ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਬਲਾਈਟ ਅਤੇ ਪੈਰਾਵਿਲਟ ਦਾ ਹਮਲਾ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਾਲਣਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਤਾ ਮਰੋੜ ਰੋਗ ਦਾ ਹਮਲਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਫਸਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਹੈ।</p> <p>ਸਿਰਸਾ ਵਿਖੇ ਫਸਲ 60-75 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫਸਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਬਾਰਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸ ਚੂਸਣ ਵਾਲੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਰਥਿਕ ਕਗਾਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦੀ ਦਰ 5.8-9.6 ਪ੍ਰਤੀ ਤਿੰਨ ਪੱਤੇ, ਜੂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 13-29 ਪ੍ਰਤੀ ਤਿੰਨ ਪੱਤੇ ਅਤੇ ਤੇਲੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 0-3 ਪ੍ਰਤੀ ਤਿੰਨ ਪੱਤੇ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਡਸਕੀ ਕਾਟਨ ਬਗ ਦਾ ਹਮਲਾ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।</p> <p>ਸਲਾਹ:</p> <p>ਰਸ ਚੂਸਣ ਵਾਲੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਫਸਲ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਪੀਲੇ ਕਾਰਡ ਲਗਾਉਣ। ਜੇਕਰ ਰਸ ਚੂਸਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀੜੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਰਥਿਕ ਕਗਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿੰਮ ਅਧਾਰਿਤ ਕੀਟਨਾਸਕ 5 ਮਿਲੀਲਿਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਿਲੀਬੱਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਛੇੜਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬੂਟਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਲੀਬੱਗ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਉਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।</p>
ਸਰਸਾ					4	0	0	0	0	0	
ਰੋਹਤਕ							0	0	0		
	0				9	6				0	
ਰਾਜਸਥਾਨ											<p>ਸ੍ਰੀ ਰੰਗਾਨਗਰ ਵਿਖੇ ਫਸਲ 50-80 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਫਸਲ ਦੀ ਗੋਡੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਤ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਦੀਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਟਸਿੱਟ, ਤਾਦਲਾ, ਮੋਥਾ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਤੇਲੇ (4.33-11.33 ਪ੍ਰਤੀ ਤਿੰਨ ਪੱਤੇ) ਅਤੇ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ (1.33-1.67 ਪ੍ਰਤੀ ਤਿੰਨ ਪੱਤੇ) ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਰਥਿਕ ਕਗਾਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਜੂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 14.67-16.33 ਪ੍ਰਤੀ ਤਿੰਨ ਪੱਤੇ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਤਾ ਮਰੋੜ (10-15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਦਾ ਹਮਲਾ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।</p> <p>ਸਲਾਹ:</p>
ਅਜਮੇਰ	8.8				30	0	0	0	0	0	
ਜੋਧਪੁਰ	44.5				0	0	0	0	0	0	
ਨਾਗੌਰ					138	0	0	0	0	0	
ਪਾਲੀ	15				0	0	0	0	0	0	
ਸ੍ਰੀ ਰੰਗਾਨਗਰ	0				4	0	0	0	0	0	

