

**ଭା.କୃ.ଅ.ନୁ.ପ.- କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କପା ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ନାଗପୁର
କପା ଚାଷ ପାଇ XI (ଏକାଦଶ) ସାପ୍ତାହିକ ପରାମର୍ଶ**

ODISHA		ପୂର୍ବସପ୍ତାହରେ ବାସ୍ତବିକ ବର୍ଷା (ମିମି)					ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହରେ ଆନୁମାନିକ ବର୍ଷା (ମିମି)				
		ଅଗଷ୍ଟ					ଅଗଷ୍ଟ				
		13	14	15	16	17	19	20	21	22	23
	କୋରାପୁଟ	0	0	0	0	0	6.4	3.8	3.6	7.2	10.7
	କଳାହାଣ୍ଡି	0.6	1	1	11	0	14	7	3.2	6.9	13.2
	ବଲାଙ୍ଗୀର	169	1.4	0.5	27	108	21	9.2	4.6	8.2	18.9
ବର୍ଷା ଧରିମାଣ ଓରଙ୍ଗସଂକେତ		୦.୧ ରୁ ୨.୪ ମିମି		୨.୫ ରୁ ୧୫.୫ ମିମି		୧୫.୬ ରୁ ୬୪.୪ ମିମି		୬୪.୫ ରୁ ୧୧୫.୫ ମିମି		୧୧୫.୬ ରୁ ୨୦୪.୪ ମିମି	
ବର୍ଷା ପ୍ରକାର		ଅତିଅଳ୍ପବର୍ଷା		ଅଳ୍ପବର୍ଷା		ସାଧାରଣବର୍ଷା		ପ୍ରବଳବର୍ଷା		ଅତିପ୍ରବଳବର୍ଷା	

କପା ଫସଲର ଅବସ୍ଥା:

ଓଡ଼ିଶାରେ କପା ଫସଲ ୪୩ ରୁ ୪୭ ଦିନ ଅବସ୍ଥାରେ କଢ଼ ଓ ଫୁଲ ଧରିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି । ଖୋସା କରିବା, ଦ୍ଵିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ଦଫା ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଓ ଘାସମରା ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ, ହୁଡ଼ା ଦେବା, ସବୁଜ ଖତ ପାଇଁ ଚାଷ କରା ଯାଇଥିବା ଛଣି ଫସଲକୁ ମାଟିରେ ମିଶାଇବା ଆଦି କାମ ଚାଲିଛି । ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଘାସ ଯଥା ବଡ଼ ପତ୍ର, ସରୁ ପତ୍ର ଓ ମୁଆଁ ଜାତୀୟ ଘାସ ଉଠିଛି କିନ୍ତୁ ଘାସମରା ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥିବାରୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଛି । କେତକ ସ୍ଥାନରେ ଜଉ ପୋକ ଓ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ହେବ । ଫଳରେ ଝିଉଁଳା ରୋଗ ଲାଗିବା ଓ ପତ୍ରରେ ନାଲି ଦାଗ ପଡ଼ିବ । ସୂଚନା ରହିଛି ।

ମୃତ୍ତିକାର ସ୍ଵଚ୍ଛ, ରୋଗ ପୋକ, ଓ ଖାଦ୍ୟସାର ପରିଚାଳନା ଉପରେ ସାଧାରଣ ପରାମର୍ଶ

କପା ଫସଲରୁ ଅଧିକ ଅମଳ ପାଇବା ପାଇଁ ସମତୁଲ ଖାଦ୍ୟସାର ଓ ସମନ୍ୱିତ ରୋଗ ପୋକ ପରିଚାଳନା କରିବା ନିହାତି ଦରକାର । ଏହାଦ୍ଵାରା କପା ଗଛର ଭଲ ବୃଦ୍ଧିହେବ ଯାହା ଖରଚ କମ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ରୋଗ ଓ ପୋକ ଦାଉରୁ ଫସଲକୁ ରକ୍ଷା କରାଯାଇଥାଏ ।

ମୃତ୍ତିକା ଶୁଷ୍କାଂଶୁ ଓ ଖାଦ୍ୟସାର ପରିଚାଳନା

ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟସାରର ସଠିକ୍ ପରିଚାଳନା:

କିଛି ବର୍ଷ ଅନ୍ତରରେ ଫସଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ, ମାଟି ପରୀକ୍ଷା କରି ସଠିକ୍ ପରିମାଣରେ ରାସାୟନିକ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଓ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟବହାର କରିବା ।

ଅନୁସରଣ ବ୍ୟବହାର

ଜଳ, ବୋରନ, ମ୍ୟାଗନେଶିୟମ ଓ ମାଙ୍ଗାନିଜ ଭଳି ଅନୁସରଣ ଅଭାବ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଓ ସଠିକ୍ ମାତ୍ରାରେ ପାତ୍ର ସିଂଚନ କରିବା ଉଚିତ ।

ସମନ୍ୱିତ ରୋଗ ପରିଚାଳନା

ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣେଇବା:

ଉଭୟ ଚେର ଓ ପତ୍ରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବା ଜୀବାଣୁମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଜମିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଓ ସଫା ରଖିବା, ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଜୈବିକ କୀଟଓଫିମିନାଶକ ଏବଂ ଯିବାକୁ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦରକାର ।

ଗଛରେ ଲାଗୁଥିବା ରୋଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ:

ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅଧିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ଥିବା ସମୟରେ ଅଧିକ ରୋଗ ସଂକ୍ରମଣ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ପ୍ରତିଦିନ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ଉଚିତ ଓ କୌଣସି ରୋଗ ଅତିମାତ୍ରାରେ ଫସଲକୁ କ୍ଷତି କରିବାର ଆଶଙ୍କା ଥିଲେ ସଠିକ୍ ଔଷଧକୁ ସଠିକ୍ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଉଚିତ ।

ସମନ୍ୱିତ ପୋକ ପରିଚାଳନା

ନିୟମିତ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରିବା:

ଫସଲର ବୃଦ୍ଧି ସମୟରେ ନିୟମିତ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ଦ୍ଵାରା ଏହି ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ଚିହ୍ନିବା ଲାଭ ପାଏ, ପତ୍ରାଦି ଅଁପୋପୋକ, ପତ୍ରଭୁକୁଣି, ଧଳାମାଛି ଭଳି ଶୋଷକ ପୋକ ଓ ବକରିବିନ୍ଧା ପୋକର ଆକ୍ରମଣ ବିଷୟରେ ଜାଣି ପାରିବ ଏହି ଉଚିତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ହେବ ।

ସଜାଆକର୍ଷକ ଜନ୍ତୁ ଓ ଜୈବ କୀଟନାଶକ ବ୍ୟବହାର:

ଫସଲର ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ସଜାଆକର୍ଷକ ବସାଇବା ଦ୍ଵାରା ପୋକମାନଙ୍କର ଗତିବିଧି ଓ ଅଣ୍ଟାଦେବା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ମିଳି ପାରିବ ଓ ପାକନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଥମରୁ ରାସାୟନିକ କୀଟନାଶକ ବ୍ୟବହାର ନ କରି ଜୈବ କୀଟନାଶକ ଥାନିମ୍ବ ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ।

ଉପକାରୀକୀଟଗୁଡ଼ିକର ସଂରକ୍ଷଣ:

ଉପକାରୀକୀଟଗୁଡ଼ିକର ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାଦ୍ୱାରା ଅପକାରୀକୀଟମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ,
ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମରୁ କୌଣସି ଶରୀରାୟାନ୍ନ ନିକଟୀତ ନାଶକ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଅନୁଚିତ ।

ରାସାୟନିକ କୀଟନାଶକର କମ ବ୍ୟବହାର:

ପୋକର ପ୍ରକାରଭେଦ ଓ ଆର୍ଥିକ ଦହେଲି ସୀମା ଅନୁସାରେ ଅନୁମୋଦିତ ରାସାୟନିକ କୀଟନାଶକ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ଉଚିତ ।

ସ୍ଥାନୀୟ ପରାମର୍ଶ:

ଓଡ଼ିଶାରେ କପା ଫସଲ ୪୩ ରୁ ୪୭ ଦିନ ଅବସ୍ଥାରେ କଟ ଓ ଫୁଲ ଧରିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି । କୋଡା ଖୋସା କରି ଘାସ ବାଛି ଦିଅନ୍ତୁ । ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଫା ସାର ହିସାବରେ ୫୦% ଯାବନ୍ଧାରଜନ ଓ ୫୦% ପୋଟାସ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ଜମିରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ନାଳୀର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ । ଜମିର ପାଗ ଓଦା ଥିଲେ ଓ କୋଡା ଖୋସା କରି ଘାସ ବାଛି ନ ପାରିଲେ ୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ୨ ମିଲି କ୍ୱିକ୍‌ଲୋପ ଲଥାଇଲ ୫% ଲସି (ସରୁ ପତ୍ର ଘାସ ପାଇଁ) ସହିତ ୧.୫ ମିଲି ପାଇରିଥାଆସକ ସୋଡିୟମ ୧୦% ଲସି (ବଡ଼ ପତ୍ର ଘାସ ପାଇଁ) କିମ୍ବା ୨- ୨.୫ ମିଲି ପାଇରିଥାଆସକ ସୋଡିୟମ ୬ % ଓ କ୍ୱିକ୍‌ଲୋପ ଲଥାଇଲ ୫% ଘାସମରା ଔଷଧ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ । ରୋଗ ଓ ପୋକ ଆକ୍ରମଣର ଅବସ୍ଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଫସଲ ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ । ସୋଶୋକ ପୋକ ଯଥା ଜରୁ ପୋକ ନ ଲାଗିବା ପାଇଁ ୧୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ୩୦ ମିଲି ନିମ୍ବ ଔଷଧ (୧୫୦୦ PPM) ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ । କପା ଫସଲ ୬୦ ଦିନର ହେବ ପରେ କିମ୍ବା ଯଦି ପୋକ ସଂଖ୍ୟା ଆର୍ଥିକ ଦହେଲି ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କଲେ (୧୦ % ଗଛ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ) ୧୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ୨୦ ମିଲି ବୁପ୍ରୋଫେଜିନ କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ । ଲେଡ଼ା ପୋକର ଆକ୍ରମଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେକ୍ଟର ପିଛା ୫ ଟି ସାଙ୍ଗ ଆକର୍ଷକ ଜନତା ବସାନ୍ତୁ । ଝଞ୍ଜା ରୋଗର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଲିଟର ପିଛା ୧୦ ମି ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ କୋବଲ୍ କୋରାଇଡ ଅଭିଷେପ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ୧୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ୨୫୦ ଗ୍ରାମ କୋପର ଆକ୍ସିକ୍ଲୋରାଇଡ ୫୦% WP କିମ୍ବା ୧୦୦ ଗ୍ରାମ କରବେନଡାଜିମ ୫୦% WP ସହିତ ୨ କିଗ୍ରା ଯୁରିୟା ସାର ମିଶାଇ ଗଛ ମୂଳରେ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ । କଟ ଓ ଫୁଲ ଝଡ଼ିବା କମ କରିବା ପାଇଁ କପ ଲଗାଇବାର ୪୫ ଦିନ ପରେ ୧୫ ଲିଟର ପାଣିରେ ୩.୫ ମିଲି ହିସାବରେ ଆଲଫା ନପ୍ଥାଲିକ ଏସିଟିକ ଏସିଡ (ପ୍ଲାନୋଫିକ୍ସ) ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ । ନାଲି ପାତ୍ର ଅଗର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ୧୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ୧୦୦ ଗ୍ରାମ ମ୍ୟାଗନେଶିୟମ ସଲଫେଟ ସହିତ ୧୦୦ ଗ୍ରାମ ଯୁରିୟା ସାରା ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ । ତେର ଶଙ୍ଖା ଓ ଝଞ୍ଜା ରୋଗର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ରୋଗର ସଂକେତ ମିଳିବ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ୧୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ୫୦ ଗ୍ରାମ ଟ୍ରାଇକୋଡର୍ମା ଭିରିଡି ୧% WP କିମ୍ବା ୨୦ ଗ୍ରାମ କରବେନଡାଜିମ ୫୦% WP ଅଭିଷେପ ଗଛ ମୂଳରେ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।

ଉନ୍ନତ କପା ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରଣାଳୀ ଯଥାମୃତ୍ତିକା ଓ ବିହନ ଚୟନ, ସାର ପ୍ରୟୋଗ, କୃଷିବାପଙ୍କତି, ଜଳ ସେଚନ ଓ ଘାସ ପରିଚାଳନା, ରୋଗ ପୋକ ପରିଚାଳନା ଇତ୍ୟାଦି ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଟାଏ ଡାଆରିତ (ସିଆଇସିଆର କଟନ ଆପ(CICRCottonApp ଯାହାକି ଆଇସିଏଆର-ସିଆଇସିଆର, ନାଗପୁର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି

ସେଥିରୁ ମିଳିପାରିବ ଶୁଗଲ ପ୍ଲେଣ୍ଡୋରୁ ଏହି ଆପକୁ ମାଗଣାରେ ଡାଉନଲୋଡ କରାଯାଇପାରିବ । ଏହାଛଡା ଫସଲର ଅବସ୍ଥା ଓ ପାଣି ପାଗ ଭିତ୍ତିକ ସାପ୍ତାହିକ ପରାମର୍ଶ ଗୁଡ଼ିକ ଆଇସିଏଆର-ସିଆଇସିଆର ୱେବସାଇଟ (<https://cicr.org.in/resource-weekly-advisory>) ରେ ଅପଲୋଡ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ସବୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଉପକାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିବ ।