

**ଭା.କୃ.ଅ.ନୁ.ପ.- କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କପା ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ନାଗପୁର
କପା ଚାଷ ପାଇଁ XII (ଦ୍ଵାଦଶ) ସାପ୍ତାହିକ ପରାମର୍ଶ**

ODISHA		ପୂର୍ବସପ୍ତାହରେ ବାସ୍ତବିକ ବର୍ଷା (ମିମି)					ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହରେ ଆନୁମାନିକ ବର୍ଷା (ମିମି)				
		ଅଗଷ୍ଟ					ଅଗଷ୍ଟ/ସେପ୍ଟେମ୍ବର				
		20	21	22	23	24	26	27	28	29	30
	କୋରାପୁଟ	0	0	0	0	0	3.3	4.2	6.8	10.8	10.8
	କଳାହାଣ୍ଡି	5	0	1	34	0	6.6	5.7	8.8	16.2	19.1
	ବଲାଙ୍ଗିର	10	0	3.2	77.2	0	8.6	11	12	16.7	22.8
ବର୍ଷା ଯରିମାଣ ଓରଙ୍ଗ ସଂକେତ		୦.୧ ରୁ ୨.୪ ମିମି		୨.୫ ରୁ ୧୫.୫ ମିମି		୧୫.୬ ରୁ ୬୪.୪ ମିମି		୬୪.୫ ରୁ ୧୧୫.୫ ମିମି		୧୧୫.୬ ରୁ ୨୦୪.୪ ମିମି	
ବସା ପ୍ରକାର		ଅତ୍ୟଧିକ ବସା		ଅଧିକ ବସା		ସାଧାରଣ ବସା		ପ୍ରବଳ ବସା		ଅତ୍ୟଧିକ ବସା	

କପା ଫସଲର ଅବସ୍ଥା:

ଓଡ଼ିଶାରେ କପା ଫସଲ ୫୦ ରୁ ୫୪ ଦିନ ଅବସ୍ଥାରେ କଢ଼ ଓ ଫୁଲ ଧରିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି । ଲମ୍ବୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ହେବ ଫଳରେ କୋଡ଼ା ଖୋସା କରିବା, ଦ୍ଵିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ଦଫା ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଓ ଘାସମରା ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ, ହୁଡ଼ା ଦେବା କାମ ରାୟଗଡ଼, କଳାହାଣ୍ଡି ଓ ବଲାଙ୍ଗିର ଜିଲ୍ଲାରେ ବାଧ୍ୟତାପୂର୍ବକ ହେଉଛି । ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଘାସ ଯଥା ବଡ଼ ପତ୍ର, ସରୁ ପତ୍ର ଓ ମୁଆଁ ଜାତୀୟ ଘାସ ଉଠିଛି କିନ୍ତୁ ଘାସମରା ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥିବାରୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଛି । କେତକ ସ୍ଥାନରେ ଜଉ ପୋକ ଓ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ହେବା ଫଳରେ ଝଞ୍ଜଳା ରୋଗ ଲାଗିବା ଓ ପତ୍ରରେ ନାଲି ଦାଗ ପଡ଼ିବ । ସୂଚନା ରହିଛି ।

ମୃତ୍ତିକାର ସ୍ୱଚ୍ଛ, ରୋଗ ପୋକ, ଓ ଖାଦ୍ୟସାର ପରିଚାଳନା ଉପରେ ସାଧାରଣ ପରାମର୍ଶ

କପା ଫସଲରୁ ଅଧିକ ଅମଳ ପାଇବା ପାଇଁ ସମତୁଲ ଖାଦ୍ୟସାର ଓ ସମନ୍ୱିତ ରୋଗ ପୋକ ପରିଚାଳନା କରିବା ନିହାତି ଦରକାର । ଏହାଦ୍ଵାରା କପା ଗଛର ଭଲ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଯାହା ଖରଚ କମ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ରୋଗ ଓ ପୋକ ଦାଉରୁ ଫସଲକୁ ରକ୍ଷା କରାଯାଇଥାଏ ।

ମୃତ୍ତିକା ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ଖାଦ୍ୟସାର ପରିଚାଳନା

ମୃତ୍ତ୍ୟୁ ଖାଦ୍ୟସାରର ସଠିକ୍ ପରିଚାଳନା:

କିଛି ବର୍ଷ ଅନ୍ତରେ ଫସଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ, ମାଟି ପରୀକ୍ଷା କରି ସଠିକ୍ ପରିମାଣରେ ରାସାୟନିକ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଓ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟବହାର କରିବା ।

ଅନୁସରଣ ବ୍ୟବହାର

ଜିଙ୍କ, ବୋରନ, ମ୍ୟାଗନେସିୟମ ଓ ମାଙ୍ଗାନିଜ ଭଳି ଅନୁସରଣ ଅଭାବ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଓ ସଠିକ୍ ମାତ୍ରାରେ ପାତ୍ର ସିଂଚନ କରିବା ଉଚିତ ।

ସମନ୍ୱିତ ରୋଗ ପରିଚାଳନା

ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣେଇବା:

ଉତ୍ତମ ଚେର ଓ ପତ୍ରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବା ଜୀବାଣୁମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଜମିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଓ ସଫା ରଖିବା, ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଜୈବିକ କୀଟ ଓ ଫିମିନାଶକ ଏବଂ ଯିବାନୁ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦରକାର ।

ଗଛରେ ଲାଗୁଥିବା ରୋଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ:

ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅଧିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ଥିବା ସମୟରେ ଅଧିକ ରୋଗ ସଂକ୍ରମଣ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ପ୍ରତିଦିନ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ଉଚିତ । କୌଣସି ରୋଗ ଅତିମାତ୍ରାରେ ଫସଲକୁ କ୍ଷତି କରିବା ଆଶଙ୍କା ଥିଲେ ସଠିକ୍ ଔଷଧକୁ ସଠିକ୍ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଉଚିତ ।

ସମନ୍ୱିତ ପୋକ ପରିଚାଳନା

ନିୟମିତ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରିବା:

ଫସଲର ବୃଦ୍ଧି ସମୟରେ ନିୟମିତ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ଦ୍ଵାରା ଏହି ରୋଗ ଥିବା ଲକ୍ଷଣ ପୋକ, ପତ୍ରାଦି ଅଁପୋପୋକ, ପତ୍ରଭୁକ୍ତ, ଧଳାମାଛି ଭଳି ଶୋଷକ ପୋକ ଓ ବକର ବିଷାପୋକର ଆକ୍ରମଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବ । ସହିତ ଉଚିତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ହେବ ।

ସଙ୍ଗ ଆକର୍ଷକ ଜନ୍ତୁ ଓ ଜୈବ କୀଟନାଶକ ବ୍ୟବହାର:

ଫସଲର ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ସଙ୍ଗ ଆକର୍ଷକ ଜନ୍ତୁ ବସାଇବା ଦ୍ଵାରା ପୋକମାନଙ୍କ ଗତିବିଧି ଓ ଅଣ୍ଟାଦେବା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ମିଳିପାରିବ । ପୋକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ସାଧାରଣ ପୋକମାନଙ୍କ ଗତିବିଧି ଓ ଅଣ୍ଟାଦେବା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ମିଳିପାରିବ ।

ୟନ୍ତ୍ରଣପାଇଁ ପ୍ରଥମରୁ ରାସାୟନିକ କୀଟନାଶକ ବ୍ୟବହାର ନକରି ଜୈବ କୀଟନାଶକ ତଥା ନିମ୍ନ ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ।

ଉପକାରୀ କୀଟଗୁଡ଼ିକର ସଂରକ୍ଷଣ:

ଉପକାରୀ କୀଟଗୁଡ଼ିକର ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଅପକାରୀ କୀଟମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ,
ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମରୁ କୌଣସି ରାସାୟନିକ କୀଟନାଶକ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଅନୁଚିତ ।

ରାସାୟନିକ କୀଟନାଶକର କମ ବ୍ୟବହାର:

ପୋକର ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଭେଦ ଓ ଆର୍ଥିକ ଦହେଲି ସୀମା ଅନୁସାରେ ଅନୁମୋଦିତ ରାସାୟନିକ କୀଟନାଶକ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ଉଚିତ ।

ସ୍ଥାନୀୟ ପରାମର୍ଶ:

ଓଡ଼ିଶାରେ କପା ଫସଲ ୫୦ ରୁ ୫୪ ଦିନ ଅବସ୍ଥାରେ କଢ଼ ଓ ଫୁଲ ଧରିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି । କୋଡ଼ା ଖୋସା କରି ଘାସ ବାଛି ଦିଅନ୍ତୁ । ତୃତୀୟ ଦଫା ସାର ହିସାବରେ ୨୫ % ଯାବନ୍ଧାରଜନ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ଜମିରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ନାଳୀର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ । ମିର ପାଗ ଓଦା ଥିଲେ ଓ କୋଡ଼ା ଖୋସା କରି ଘାସ ବାଛି ନ ପାରିଲେ ୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ୨ ମିଲି କ୍ଲିଜାକ୍ଲୋପ ଇଥାଇଲ ୫% ଇସି (ସରୁ ପତ୍ର ଘାସ ପାଇଁ) ସହିତ ୧.୫ ମିଲି ପାଇରିଥାଆବକ ସୋଡ଼ିୟମ ୧୦% ଇସି (ବଡ଼ ପତ୍ର ଘାସ ପାଇଁ) କିମ୍ବା ୨-୨.୫ ମିଲି ପାଇରିଥାଆବକ ସୋଡ଼ିୟମ ୬ % ଓ କ୍ଲିଜାକ୍ଲୋପ ଇଥାଇଲ ୫% ଘାସମରା ଔଷଧ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ । ରୋଗ ଓ ପୋକ ଆକ୍ରମଣର ଅବସ୍ଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଫସଲ ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ । ସୋଶୋକ ପୋକ ଯଥା ଜଉ ପୋକ ନ ଲାଗିବା ପାଇଁ ୧୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ୩୦ ମିଲି ନିମ୍ନ ଔଷଧ (୧୫୦୦ PPM) ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ । କପା ଫସଲ ୬୦ ଦିନର ହେବ ପରେ କିମ୍ବା ଯଉ ପୋକ ସଂଖ୍ୟା ଆର୍ଥିକ ଦହେଲି ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କଲେ (୧୦ % ଗଛ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ) ୧୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ୨୦ ମିଲି ବ୍ରୁପ୍ରୋଫେଜିନ କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ । ଲେଡ଼ା ପୋକର ଆକ୍ରମଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେକ୍ଟର ପିଛା ୫ ଟି ସାଙ୍ଗ ଆକର୍ଷକ ଜନତା ବସାନ୍ତୁ । ଝଞ୍ଜା ରୋଗର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଲିଟର ପିଛା ୧୦ ମି ଗ୍ରା ହିସାବରେ କୋବଲ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ଼ ଅଭିଷେଧ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ୧୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ୨୫୦ ଗ୍ରାମ କୋପର ଆକ୍ସିକ୍ଲୋରାଇଡ଼ ୫୦% WP କିମ୍ବା ୧୦୦ ଗ୍ରାମ କରବେନଡାଜିମ ୫୦% WP ସହିତ ୨ କିଗ୍ରା ମୁରିୟା ସାର ମିଶାଇ ଗଛ ମୂଳରେ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ । କଢ଼ ଓ ଫୁଲ ଝଡ଼ିବା କମ କରିବା ପାଇଁ କପ ଲଗାଇବାର ୪୫ ଦିନ ପରେ ୧୫ ଲିଟର ପାଣିରେ ୩.୫ ମିଲି ହିସାବରେ ଆଲଫା ନପ୍ଥାଲିକ ଏସିଡିକ ଏସିଡି (ପ୍ଲାନୋଫିକ୍ସ) ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ । ନାଲି ପାତ୍ର ଅଗର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ୧୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ୧୦୦ ଗ୍ରାମ ମ୍ୟାଗନେଶିୟମ ସଲଫେଟ ସହିତ ୧୦୦ ଗ୍ରାମ ମୁରିୟା ସାରା ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ । ଟେର ଶଙ୍ଖା ଓ ଝଞ୍ଜା ରୋଗର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ରୋଗର ସଂକେତ ମିଳିବ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ୧୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ୫୦ ଗ୍ରାମ ଟ୍ରାଇକୋଥର୍ମା ଭିରିଡି ୧% WP କିମ୍ବା ୨୦ ଗ୍ରାମ କରବେନଡାଜିମ ୫୦% WP ଅଭିଷେଧ ଗଛ ମୂଳରେ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।

ଉଚ୍ଚତକପା ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରଣାଳୀ ଯଥାମୂଳିକା ଓ ବିହନ ତୟନ, ସାର ପ୍ରୟୋଗ, ବୃଦ୍ଧି ବାଧକ, ଜଳ ସେଚନ ଓ ଘାସ ପରିଚାଳନା, ରୋଗ ପୋକ ପରିଚାଳନା ଇତ୍ୟାଦି ଗୋଟିଏ ଅସ୍ତ୍ରୋଷ୍ଟ୍ର ଆଧାରିତ (ସିଆଇସିଆର କଟନ ଆପ(CICRCottonApp) ଯାହାକି ଆଇସିଏଆର-ସିଆଇସିଆର, ନାଗପୁର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି

ସେଥିରୁ ମିଳିପାରିବ ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେଷ୍ଟୋରୁ ଏହି ଆପକୁ ମାଗଣାରେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରାଯାଇପାରିବ । ହାତୀ ଫସଲର ଅବସ୍ଥା ଓ ପାଣି ପାଗ ଭିତ୍ତିକ ସାପ୍ତାହିକ ପରାମର୍ଶ ଗୁଡ଼ିକ ଆଇସିଏଆର-ସିଆଇସିଆର ୱେବସାଇଟ (<https://cicr.org.in/resource-weekly-advisory>) ରେ ଅପଲୋଡ଼ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ସବୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଉପକାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିବ ।