



भा. कृ. अनु. प.- केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, नागपुर
ICAR-Central Institute for Cotton Research, Nagpur
 An ISO 9001:2015 Certified Organisation

పత్తి సాగు- పద్నాలుగవ వారపు సలహా సెప్టెంబర్ 10, 2026 నుండి 16 సెప్టెంబర్ 2026 వరకు
నేల ఆరోగ్యం, పోషణ, అలాగే చీడపీడలు మరియు తెగుళ్ల నిర్వహణపై సూచనలు

అధిక పత్తి దిగుబడులు సమతుల్యమైన నేల పోషకాలు, నీటి నిర్వహణ మరియు ముందుచూపుతో కూడిన, పర్యవేక్షణ ఆధారిత తెగుళ్లు, వ్యాధుల నివారణపై ఆధారపడి ఉంటాయి. సమగ్రమైన మరియు ఏకీకృత పంట నిర్వహణ ప్రణాళికను అమలు చేయడం ద్వారా పంట సరైన పెరుగుదలను, బలాన్ని పొందుతుంది, పెట్టుబడి ఖర్చులు తగ్గుతాయి మరియు పంటను తీవ్రమైన తెగుళ్లు, వ్యాధుల నష్టం నుండి కాపాడుతుంది.

నేల ఆరోగ్యం మరియు పోషక యాజమాన్యం:

- **స్థూల పోషకాలను వాడటం:** పంట మార్పిడి, సేంద్రీయ సవరణలు మరియు కవర్ క్రాప్స్ కు ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం ద్వారా, మరియు విత్తే ముందు చేసే నేల పరీక్ష ఆధారంగా హేతుబద్ధమైన రసాయన ఎరువులను ఉపయోగించడం ద్వారా నేల ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచండి.
- **సూక్ష్మ పోషకాలను అందచేయుట:** అవసరమైనప్పుడు పిచికారీల ద్వారా ద్వితీయ మరియు సూక్ష్మపోషకాల లోపాలను (జింక్, బోరాన్, మాంగనీస్ మరియు మెగ్నీషియం వంటివి) ముందుగానే పరిష్కరించండి.

సమగ్ర తెగుళ్ల యాజమాన్యం

- **ముందు జాగ్రత్త చెరియలు:** మొక్కల ఆరోగ్యాన్ని పెంపొందించడానికి మరియు తెగుళ్ల ఉద్ధతిని తగ్గించడానికి, సరైన క్షేత్ర పరిశుభ్రతతో పాటు విత్తన మరియు నేల చికిత్సలుగా జీవన పురుగుమందులు మరియు జీవన ఎరువులను వాడటం వంటి సమగ్ర సాగు పద్ధతుల ద్వారా నేల మరియు ఆకుల ద్వారా వ్యాపించే వ్యాధికారక జీవులను అదుపు చేయాలి.
- **ఆకులపై వ్యాపించే తెగుళ్లను అదుపు చేయడం:** గాలిలో అధిక తేమ ఉన్న ప్రాంతాలలో పొలాలను క్రమం తప్పకుండా పర్యవేక్షించాలి, మరియు వ్యాధి వేగంగా అభివృద్ధి చెంది వ్యాప్తి చెందడానికి పర్యావరణ పరిస్థితులు అనుకూలంగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే, సిఫార్సు చేయబడిన శిలీంధ్రనాశకాలను ఉద్ధతిని బట్టి వాడాలి.

సమగ్ర పురుగుల యాజమాన్యం

- **క్షేత్ర పరిశీలన నిర్వహించండి:** కాయతొలుచు పురుగులతో పాటు, రసం పీల్చే పురుగులు (తామర, పేనుబంక, పచ్చ దోమ మరియు నల్లి) పర్యవేక్షించడానికి వారానికి ఒకసారి క్షేత్ర పరిశీలన చేయండి.
- **లింగాకర్షక బట్టలు మరియు జీవ సంబంధిత పురుగుమందులను ఉపయోగించండి:** తల్లి రెక్కల పురుగుల ఉనికిని గమనించడానికి పొలం లో బుట్టలు పెట్టాలి, రెక్కల పురుగు గుడ్డు పెట్టే సమయాన్ని గమనించాలి మరియు సేంద్రీయ, సహజ, లేదా మొక్కల ఆధారిత పురుగుమందులను వాడటానికి పంట మొదటి దశలోనే చూడాలి.
- **సహజ శత్రువులను సంరక్షించండి:** అన్ని రకాలా పురుగుమందులు బదులుగా ఎంపిక చేసిన పురుగుమందులను ఎంచుకోవడం ద్వారా అక్షంతల పురుగులు , లేస్వింగ్స్ మరియు బిగ్-బడ్ బగ్స్ వంటి ప్రయోజనకరమైన కీటకాలను కాపాడండి.
- **రసాయన పురుగుమందులను మితంగా వాడటం:** లేబుల్పై సిఫార్సు చేయబడిన రసాయన పురుగుమందులను చివరి ప్రయత్నంగా మాత్రమే ఉపయోగించండి; పురుగులు ఆర్థిక నష్ట పరిమితి స్థాయికు చేరినప్పుడు మాత్రమే వాటిని ఉపయోగించాలి.



भा. कृ. अनु. प.- केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, नागपुर
ICAR-Central Institute for Cotton Research, Nagpur
 An ISO 9001:2015 Certified Organisation

పత్తి సాగు- పద్నాలుగవ వారపు సలహా సెప్టెంబర్ 10, 2026 నుండి 16 సెప్టెంబర్ 2026 వరకు

ఆంధ్ర ప్రదేశ్		గత వారంలో అసలైన వర్షపాతం (mm)							వచ్చే వారంలో వర్షపాతం అంచనా (mm)				
		సెప్టెంబర్							సెప్టెంబర్				
		01	02	03	04	05	06	07	09	10	11	12	13
	గుంటూరు	0	7	0	0	0	0	14	4.2	0.3	5.3	7.6	4.2
	ప్రకాశం	0	0	0.2	0.5	0	0	0	1.2	0.6	5.2	5.7	3
వర్షపాతం మొత్తం మరియు రంగు		0.1 to 2.4 mm		2.5 to 15.5 mm		15.6 to 64.4 mm			64.5 to 115.5 mm		115.6 to 204.4		
వర్షపాత వర్గం		చాలా తక్కువ వర్షపాతం		తేలికపాటి వర్షపాతం		మోస్తరు వర్షపాతం			భారీ వర్షపాతం		అతి భారీ వర్షపాతం		

పంట పరిస్థితి:

గుంటూరులో విత్తన ప్రకీరియ పూర్తయింది మరియు ఇకపై విత్తనాలు వేయవద్దని సూచించడమైనది. పత్తి పొలాలలో అంతర కృషి మరియు కలుపు నివారణ పనులు పూర్తయ్యాయి. ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో, వర్షాభావం కారణంగా చాలా వరకు పొలాలలో పంట ఎండిపోవడం మరియు వాడిపోవడం జరుగుతోంది. తామర పురుగులు మరియు పచ్చ దోమల వంటి రసం పీల్చే పురుగుల ఉధృతి ఆర్థిక నష్ట పరిమితి స్థాయిని దాటి ఉంది.

నంద్యాలలో, విత్తన పంట 59 నుండి 89 రోజుల వయస్సులో గోడ మరియు పూత దశలలో ఉంది. కర్నూలు జిల్లాలో దాదాపు 85 శాతం పత్తి సాగు భూమిని జూన్ మొదటి పక్షం రోజులలో తక్కువ తేమ పరిస్థితులలో విత్తారు, దీనివల్ల చాలా ఏరాంతాలలో పంట వాడిపోవడం మరియు తేమ ఒత్తిడి లక్షణాలను ప్రదర్శిస్తోంది. ఈ నివేదిక కాలంలో పైపాటు ఎరువుల వాడకం మరియు అంతర సాగు పనులు చేపట్టారు. చాలా ప్రదేశాలలో ఆర్థిక నష్ట పరిమితి స్థాయి చుట్టూ రసం పీల్చే పురుగుల వ్యాప్తి నమోదైంది. కొన్ని పొలాలలో గులాబీ కాయతొలుచు పురుగుల వ్యాప్తి కూడా గమనించబడింది.

సలహా:

గుంటూరు ఏరాంతంలో, విత్తే సమయంలో నేల ద్వారా సంక్రమించే తెగుళ్లను (వేరు కుళ్లు మరియు బ్యాక్టీరియా ఎండు తెగులు) నివారించడానికి, రైతులు విత్తనాలకు 'కార్పాక్సిన్ 37.5% + థిరామ్ 37.5% DS' (కిలో విత్తనానికి 3.5 గ్రాములు) లేదా 'ఫ్లక్సాపైరోక్సాడ్' (కిలో విత్తనానికి 1.5 మి.లీ) లేదా 'టెట్రాకోన్జోల్' (కిలో విత్తనానికి 1.5 మి.లీ) మందులతో విత్తన శుద్ధి చేసుకోవాలి. అలాగే, 'అజోబ్ బాక్టర్', 'PSB' మరియు 'KMB' వంటి జీవన ఎరువులను (కిలో విత్తనానికి 10 మి.లీ చొప్పున) లేదా 100 కిలోల పశువుల ఎరువుతో (FYM) కలిపిన 'ట్రైకోడెర్మా హార్మోనం' (పెక్టారుకు 2.5 కిలోలు) వాడాలి. మొలక దశలో సమస్యలు రాకుండా ఉండాలంటే, కనీసం 80-100 మి.మీ వర్షం కురిసిన తర్వాతే పంటను విత్తాలి; పొడి నేలలో విత్తడం చేయకూడదు. పంట ఏరాంతం దశలో కలుపు మొక్కల నివారణకు, ఎకరాకు 700 మి.లీ 'పెండిమెథాలిన్ 38.7 CS' మందును 200 లీటర్ల నీటిలో కలిపి, విత్తిన వెంటనే (మొక్కలు మొలకెత్తకముందే) పిచికారీ చేయాలి. అయితే, నేల పొడిగా ఉన్నప్పుడు ఈ మందును వాడకూడదు. విత్తిన 30 రోజుల లోపు ఎకరాకు 60 కిలోల P2O5 (భాస్వరం), 50 కిలోల N (నత్రజని) మరియు 20 కిలోల K2O (పొటాష్) ఎరువులను వేయాలి. TSV వైరస్ వ్యాప్తిని నివారించడానికి పొలం గట్టపై ఉన్న కలుపు మొక్కలను తొలగించాలి. తామర పురుగులను పర్యవేక్షించడానికి పెక్టారుకు 20 చొప్పున, మరియు వాటి నివారణకు పెక్టారుకు 100 చొప్పున నీలి రంగు జిగురు ఉచ్చులను అమర్చండి. వ్యాధి వ్యాప్తిని నివారించడానికి TSV సోకిన మొక్కలను వేళ్లతో సహా పెకిలించి నాశనం చేయండి మరియు పొలాల పరిశుభ్రతను ఖచ్చితంగా పాటించండి, ముఖ్యంగా పత్తి పొలాలలో మరియు చుట్టుపక్కల పార్శ్వనియం కలుపును తొలగించండి మరియు తీరిప్పి కోసం సిఫార్సు చేయబడిన నివారణ పద్ధతులను పాటించండి. రసం పీల్చే పురుగుల నుండి నివారణ చర్యగా మరియు ఏరాంతం దశలో ఉండే గులాబీ కాయతొలుచు పురుగుల వ్యాప్తిని అరికట్టడానికి, 200 లీటర్ల నీటిని ఉపయోగించి ఎకరానికి 1 లీటరు చొప్పున వేప ఆధారిత పురుగుమందులను పిచికారీ చేయండి.

నంద్యాలలో, తాత్కాలిక కరువు పరిస్థితులను తట్టుకోవడానికి రైతులకు యూరియా లేదా 13-0-45ను లీటరు నీటికి 10 గ్రాముల చొప్పున పిచికారీ చేయమని సలహా ఇవ్వబడింది. రసం పీల్చే పురుగుల నివారణకు, ఎకరానికి 1 లీటరు చొప్పున వేప నూనెను (200 లీటర్ల నీటిలో కలిపి) పిచికారీ చేయండి. పంట ఏరాంతం దశలో ఆర్థిక నష్ట పరిమితి స్థాయి తర్వాత, లీటరు నీటికి 0.4 మి.లీ. ఇమిడాక్లోప్రిడ్ లేదా 0.2 గ్రాముల ఎసిటామిప్రిడ్ను పిచికారీ చేయండి. TSV వైరస్ వ్యాప్తిని నివారించడానికి గట్టపై ఉన్న కలుపును తొలగించండి. ఒకవేళ గులాబీ కాయతొలుచు పురుగు ఏరాంతం కురుపును దాటితే, 200 లీటర్ల నీటిని ఉపయోగించి ఎకరానికి 500 మి.లీ. ప్రిఫెన్ ఫాస్ను పిచికారీ చేయండి. అధిక సాంద్రత నాటు పద్ధతి (90 x 15 సెం.మీ.) లేదా దగ్గరి అంతరం (90 x 30 సెం.మీ.) పత్తిని అనుసరించే రైతులు, పంట 40-45 రోజుల వయస్సులో లేదా మొగ్గలు ఏర్పడినప్పుడు లీటరు నీటికి 1 మి.లీ. చొప్పున మొక్కల పెరుగుదల నియంత్రకం (PGR) మెపిక్వాట్ క్లోరైడ్ 5% ASను పిచికారీ చేయాలి. రెండవ పిచికారీని 15-20 రోజుల తర్వాత లీటరు నీటికి 1.0 మి.లీ. చొప్పున చేయాలి. దీర్ఘకాలం పాటు పొడి వాతావరణం కారణంగా పంట తేమ

ఒత్తిడితో బాధపడుతుంటే, మెపిక్వాట్ క్లౌరైడ్ పిచికారీని నివారించండి. ప్రత్యామ్నాయంగా, 200 లీటర్ల నీటిలో ఎకరానికి 2 కిలోల చొప్పున 13:00:45 దీరావణాన్ని ఆకులపై పిచికారీ చేయండి. కాయలు రాలిపోవడం గమనిస్తే, పత్తిలో కాయలు మరియు పువ్వులు సహజంగా రాలిపోకుండా నివారించడానికి, 10 లీటర్ల నీటికి 4 మిల్లీలీటర్ల చొప్పున NAA దీరావణాన్ని ఆకులపై పిచికారీ చేయండి. పొగాకు వైరస్ వ్యాప్తిని నివారించడానికి పంటను పర్యవేక్షించండి. పర్యవేక్షణ కోసం హెక్టారుకు 20 చొప్పున మరియు తీర్చి నివారణకు హెక్టారుకు 100 చొప్పున నీలిరంగు జిగురు ఉచ్చులను అమర్చండి. వ్యాప్తిని నివారించడానికి TSV సోకిన మొక్కలను వేళ్లతో సహా పెకిలించి నాశనం చేయండి మరియు పొలం పరిశుభ్రతను ఖచ్చితంగా పాటించండి, ముఖ్యంగా పత్తి పొలాలలో మరియు చుట్టూపక్కల పొద్దీనియం కలుపును తొలగించండి మరియు తామర పురుగుల కోసం సిఫార్సు చేయబడిన నివారణ పద్ధతులను పాటించండి. సిఫార్సు చేయబడిన పురుగుమందుల వాడకంతో వ్యాప్తిని నియంత్రించండి.



भा. कृ. अनु. प.- केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, नागपुर
ICAR-Central Institute for Cotton Research, Nagpur
 An ISO 9001:2015 Certified Organisation

పత్తి సాగు- పద్నాలుగవ వారపు సలహా సెప్టెంబర్ 10, 2026 నుండి 16 సెప్టెంబర్ 2026 వరకు

తెలంగాణ		గత వారంలో అసలైన వర్షపాతం (mm)							వచ్చే వారంలో వర్షపాతం అంచనా (mm)				
		సెప్టెంబర్							సెప్టెంబర్				
		01	02	03	04	05	06	07	09	10	11	12	13
	ఆదిలాబాద్	0	0	2	0	0	0	0	2	2.2	6.8	28.7	16.5
	వరంగల్	0	4	3	7	0	0	0	1.4	0.4	9	23.3	8.2
	ఖమ్మం	0	0	2	0	0	0	0.6	2.4	0.3	5.5	11.9	5.8
	కరీంనగర్	0	0	1.7	9.6	0.3	0	0	0.5	1.3	6.5	24.4	8.5
	మహబూబనగర్	0	0	0	0	0	0	0	0.2	0.8	3	5	1.3
వర్షపాతం మొత్తం మరియు రంగు		0.1 to 2.4 mm		2.5 to 15.5 mm		15.6 to 64.4 mm				64.5 to 115.5 mm		115.6 to 204.4	
వర్షపాత వర్గం		చాలా తక్కువ వర్షపాతం		తేలికపాటి వర్షపాతం		మోస్తరు వర్షపాతం				భారీ వర్షపాతం		అతి భారీ వర్షపాతం	

పంట పరిస్థితి:

ఆదిలాబాద్ లో, పంట ప్రస్తుతం 67 నుండి 72 రోజుల వయస్సులో ఉండి, పూత మరియు కాయ ఏర్పడే దశలో ఉంది. ఈ కాలంలో అంతర కృషి పనులు, కలుపు నివారణ మరియు పురుగుమందుల విచికారీ వంటి చర్యలు చేపట్టారు. చాలా పొలాల్లో రసం వీల్చే పురుగుల తామర పురుగులు మరియు పచ్చ దోమ ఉధృతి గమనించబడింది; అయితే, ఎటువంటి తెగుళ్ల ఆశ్రయం కనిపించలేదు.

వరంగల్ లో, పంట 77 నుండి 88 రోజుల వయస్సులో, శాఖీయ దశ నుండి పూత దశకు చేరుకుంది. చేతితో వరుసల వారీగా కలుపు తీయడం/ఎడ్జులతో లాగే దంతి లేదా గుంతకతో అంతర సాగు చేయడం మరియు రసం వీల్చే పురుగులను నియంత్రించడానికి పురుగుమందులను విచికారీ చేయడం జరిగింది. పొలాల్లో గడ్డి మరియు వెడల్పాటి ఆకుల కలుపు మొక్కలు వ్యాపించాయి. తామర పురుగు, పేనుబంక మరియు పచ్చ దోమ ఆర్థిక నష్ట పరిమితి స్థాయి కంటే ఎక్కువ కనిపించాయి. ఎటువంటి తెగుళ్లు గమనించలేదు

సలహా:

ఆదిలాబాద్ లో, నేలలో తేమను కాపాడటానికి మరియు కలుపు నియంత్రణ కోసం రైతులకు క్రమానుగతంగా గుడెంచాలని సలహా ఇవ్వబడింది. నేల తేమగా ఉండి, చేతితో కలుపు తీయడం సాధ్యం కాని పక్షంలో, పొలంలో గడ్డి జాతి కలుపు మొక్కలు ఎక్కువగా ఉంటే క్వీజల్ ఫాప్ ఇథైల్ 5% EC @ 2 ml/లీటరు నీటికి, లేదా వెడల్పాటి ఆకుల కలుపు మొక్కల కోసం ఫైరిథియోబాక్ సోడియం 10% EC @ 1.5 ml/లీటరు నీటికి, లేదా గడ్డి మరియు వెడల్పాటి ఆకుల కలుపు మొక్కలు రెండింటినీ నియంత్రించడానికి ఫైరిథియోబాక్ సోడియం 6% + క్వీజల్ ఫాప్ ఇథైల్ 4% MEC @ 2-2.5 ml/లీటరు నీటికి వంటి కలుపు సంహారక మందులను వాడాలి. పంట వేసిన 45 రోజుల తర్వాత, రసం వీల్చే పురుగులను నియంత్రించడానికి మరియు కొత్తగా ఏర్పడిన గడ్డలపై గులాబీ కాయతొలుచు పురుగు ఆడ పురుగులు గుడ్లు పెట్టకుండా నివారించడానికి, లీటరు నీటికి 5 మిల్లీలీటర్ల చొప్పున వేప ఆధారిత పురుగుమందును నివారణ విచికారీ చేయాలి. రసం వీల్చే పురుగుల సంఖ్య పరిమితిని మించి ఉంటే, లీటరు నీటికి 0.4 గ్రాముల చొప్పున ఫ్లోనికామిడ్ 50 WG విచికారీ చేయాలి. అధిక సాంద్రత నాటు పద్ధతి (90 x 15 సెం.మీ.) లేదా దగ్గరి అంతరం (90 x 30 సెం.మీ.)లో పత్తిని పండించే రైతులు, పంట వేసిన 40-45 రోజులకు లేదా గడ్డలు ఏర్పడినప్పుడు, మొక్కల పెరుగుదల నియంత్రకం (PGR) అయిన మెపిక్వాట్ క్లోరైడ్ 5% AS ను లీటరు నీటికి 1 మిల్లీలీటర్ల చొప్పున విచికారీ చేయాలి. రెండవ విచికారీని 15-20 రోజుల తర్వాత లీటరు నీటికి 1.0 మిల్లీలీటర్ల చొప్పున చేయాలి. ఎక్కువ కాలం పాటు పొడి వాతావరణం కారణంగా పంట తేమ ఒత్తిడికి గురవుతుంటే, మెపిక్వాట్ క్లోరైడ్ విచికారీని నివారించాలి. ప్రత్యామ్నాయంగా, 200 లీటర్ల నీటిలో ఎకరానికి 2 కిలోల చొప్పున 13:00:45 దీర్ఘకాలాన్ని ఆకులపై విచికారీ చేయండి. కాయలు రాలిపోవడం గమనిస్తే, పత్తిలో కాయలు మరియు పువ్వులు సహజంగా రాలిపోకుండా నివారించడానికి, 10 లీటర్ల నీటికి 4 మిల్లీలీటర్ల చొప్పున NAA దీర్ఘకాలాన్ని ఆకులపై విచికారీ చేయండి. తామర పురుగులను పర్యవేక్షించడానికి హెక్టారుకు 20 చొప్పున, మరియు వాటి నివారణకు హెక్టారుకు 100 చొప్పున నీలి రంగు జిగురు ఉచ్చులను అమర్చండి. వ్యాధి వ్యాప్తిని నివారించడానికి TSV సోకిన మొక్కలను వేళ్లతో సహా పెకిలించి నాశనం చేయండి మరియు పొలాల పరిశుభ్రతను ఖచ్చితంగా పాటించండి, ముఖ్యంగా పత్తి పొలాలలో మరియు చుట్టుపక్కల పార్శ్వనియం కలుపును తొలగించండి మరియు తీర్చికోసం సిఫార్సు చేయబడిన నివారణ పద్ధతులను పాటించండి. తామర పురుగులు ఆర్థిక నష్ట పరిమితి స్థాయి దాటినట్లు అయితే పురుగు మందులు విచికారీ చేయాలి.

వరంగల్ షెడ్యూల్ లో, వర్షాధార పంటలలో తగినంత తేమ ఉన్నప్పుడు మరియు వర్షాలు కురిసిన తర్వాత, విత్తిన 40, 60 మరియు 80 రోజుల వద్ద నత్రజని (ఎకరాకు 25 కిలోల యూరియా) మరియు పొటాషియం (ఎకరాకు 10 కిలోల MOP) ఎరువులను పైపాటుగా వేయాలని రైతులకు

సూచించడమైనది.. నేల తేమగా ఉండి, చేతితో కలుపు తీయడం సాధ్యం కాని పక్షంలో, పొలంలో గడ్డి జాతి కలుపు మొక్కలు ఎక్కువగా ఉంటే క్విజల్ ఫాస్ ఇథైల్ 5% EC @ 2 ml/లీటరు నీటికి, లేదా వెడల్పాటి ఆకుల కలుపు మొక్కల కోసం ఫైరిథియోబాక్ సోడియం 10% EC @ 1.5 ml/లీటరు నీటికి, లేదా గడ్డి మరియు వెడల్పాటి ఆకుల కలుపు మొక్కలు రెండింటినీ నియంత్రించడానికి ఫైరిథియోబాక్ సోడియం 6% + క్విజల్ ఫాస్ ఇథైల్ 4% MEC @ 2-2.5 ml/లీటరు నీటికి వంటి కలుపు సంహారక మందులను వాడాలి. రసం పీల్చే పురుగులను నియంత్రించడానికి మరియు కొత్తగా ఏర్పడిన గడ్డలపై గులాబీ కాయతొలుచు పురుగు ఆడ పురుగులు గుడ్లు పెట్టకుండా నివారించడానికి, పంట వేసిన 45 రోజుల తర్వాత (45 DAS) లీటరు నీటికి 5 మిల్లీలీటర్ల చొప్పున వేప ఆధారిత పురుగుమందును నివారణ చర్యగా పిచికారీ చేయవచ్చు. రసం పీల్చే పురుగుల జనాభా అంచనా వేయబడిన దిగుబడి పరిమితిని (ETL) మించి ఉంటే, పంట వేసిన 60 రోజుల తర్వాత (60 DAS) నుండి లీటరు నీటికి ఫ్లోనికామిడ్ 50 WG @ 0.4 గీరా లేదా డయాఫెంథియరాన్ 50 WP @ 1.25 గీరా లేదా డైనోటెఫ్యూరాన్ 20 SG @ 0.4 గీరా పిచికారీ చేయాలి. రసం పీల్చే పురుగుల సముదాయాన్ని పర్యవేక్షించడానికి మరియు నియంత్రించడానికి నివారణ చర్యగా పసుపు మరియు నీలం రంగు జిగురు ఉచ్చులను (ఎకరానికి 10 చొప్పున) ఏర్పాటు చేయండి. పొడి పరిస్థితులు గులాబీ కాయతొలుచు పురుగు వ్యాప్తికి అనుకూలంగా ఉంటాయి. కాబట్టి, పత్తి పొలాలలో ఫెరోమోన్ ఉచ్చులను (ఎకరానికి 4) ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా ఈ పురుగు వ్యాప్తిని పర్యవేక్షించండి. అధిక సాంద్రత నాటు పద్ధతి (90 x 15 సెం.మీ.) లేదా దగ్గరి అంతరం (90 x 30 సెం.మీ.) పద్ధతిలో పత్తిని నాటిన రైతులు, పంటకు 40-45 రోజుల వయస్సు ఉన్నప్పుడు లేదా కాయలు ఏర్పడటం ప్రారంభమైనప్పుడు, మొక్కల పెరుగుదల నియంత్రకం (PGR) అయిన మెపిక్వాట్ క్లోరైడ్ 5% AS ను లీటరు నీటికి 1 మి.లీ. చొప్పున పిచికారీ చేయాలి. రెండవ పిచికారీని 15-20 రోజుల తర్వాత లీటరు నీటికి 1.0 మి.లీ. చొప్పున చేయాలి. దీర్ఘకాలం పాటు పొడి వాతావరణం కారణంగా పంట తేమ ఒత్తిడికి గురవుతుంటే, మెపిక్వాట్ క్లోరైడ్ పిచికారీని నివారించాలి. ప్రత్యామ్నాయంగా, 200 లీటర్ల నీటిలో ఎకరానికి 2 కిలోల చొప్పున 13:00:45 దీరావణాన్ని ఆకులపై పిచికారీ చేయాలి. కాయలు రాలిపోవడం గమనిస్తే, పత్తిలో కాయలు మరియు పువ్వులు సహజంగా రాలిపోకుండా నివారించడానికి, 10 లీటర్ల నీటికి 4 మి.లీ. చొప్పున NAA దీరావణాన్ని ఆకులపై పిచికారీ చేయాలి. తామర పురుగులు ఆర్థిక నష్ట పరిమితి స్థాయి దాటినట్లు అయితే పురుగు మందులు పిచికారీ చేయాలి.