

ଭା.କୃ.ଅ.ନୁ.ପ.- କ୍ରେନ୍ଦ୍ରୀୟ କପା ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ନାଗପୁର
କପା ଚାଷ ପାଇଁ XIII (ତ୍ରୟୋଦଶ) ସାପ୍ତାହିକ ପରାମର୍ଶ

ODISHA		ପୂର୍ବସପ୍ତାହରେବାସ୍ତବିକବର୍ଷା(ମିମି)					ଆଗାମୀସପ୍ତାହରେଆନୁମାନିକବର୍ଷା(ମିମି)				
		ଅଗଷ୍ଟ					ଅଗଷ୍ଟ/ସେପ୍ଟେମ୍ବର				
		27	28	29	30	31	02	03	04	05	06
	କୋରାପୁଟ	0	0	0	0	0	0.9	1.6	2.9	1.8	1.6
	କଳାହାଣ୍ଡି	3	1	9	37	0	8.7	4.3	1.9	1.6	1.6
	ବଲାଙ୍ଗିର	0	0	0	0	0	8.1	8.6	7.3	2.4	1.5
ବର୍ଷା ଧରିମାଣ ଓରଙ୍ଗସଂକେତ		୦.୧ ରୁ ୨.୪ ମିମି		୨.୫ ରୁ ୧୫.୫ ମିମି		୧୫.୬ ରୁ ୬୫.୫ ମିମି		୬୫.୬ ରୁ ୧୧୫.୫ ମିମି		୧୧୫.୬ ରୁ ୨୦୫.୫ ମିମି	
ବର୍ଷାପ୍ରକାର		ଅତିଅଳ୍ପବର୍ଷା		ଅଳ୍ପବର୍ଷା		ସାଧାରଣବର୍ଷା		ପ୍ରବଳବର୍ଷା		ଅତିପ୍ରବଳବର୍ଷା	

କପାଫସଲର ଅବସ୍ଥା:

ଓଡ଼ିଶାରେକପା ଫସଲ ୫୭ ରୁ ୬୧ ଦିନ ଅବସ୍ଥାରେ କଢ଼ ଓ ବକରା ଧରିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ହେବ ଫଳରେ କୋଡ଼ା ଖୋସା କରିବା, ଦ୍ଵିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ଦଫା ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଓ ଘାସମରା ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ, ହୁଡ଼ା ଦେବା କାମ ରାୟଗଡ଼, କଳାହାଣ୍ଡି ଓ ବଲାଙ୍ଗିର ଜିଲ୍ଲାରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଘାସ ଯଥା ବଡ଼ ପତ୍ର, ସରୁ ପତ୍ର ଓ ମୁଆଁ ଜାତୀୟ ଘାସ ଉଠିଛି କିନ୍ତୁ ଘାସମରା ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥିବାରୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଛି। କେତକ ସ୍ଥାନରେ ଜଡ଼ ପୋକ ଓ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ହେବ। ଫଳରେ ଝଞ୍ଜଳା ରୋଗ ଲାଗିବା ଓ ପତ୍ରରେ ନାଲି ଦାଗ ପଡ଼ିବ। ସୂଚନା ରହିଛି ତ୍ରିତୀୟା ଦଫା ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ଶୋଷକ ପୋକ ଓ ପାତ୍ର ଖିଆ ପୋକର ପ୍ରତିଶିଷେଧ ଉପାୟ ହିସାବରେ ୧୫୦୦ ପିପିଏମ ନିୟମ ତେଲ ସିଂଚନ କର ଯାଇଛି।

ମୃତ୍ତିକାର ସ୍ଵଚ୍ଛ, ରୋଗ ପୋକ, ଓ ଖାଦ୍ୟସାର ପରିଚାଳନା ଉପରେ ସାଧାରଣ ପରାମର୍ଶ

କପା ଫସଲରୁ ଅଧିକ ଅମଳ ପାଇବା ପାଇଁ ସମତୁଲ ଖାଦ୍ୟସାର ଓ ସମନ୍ୱିତ ରୋଗ ପୋକ ପରିଚାଳନା କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଏହାଦ୍ଵାରା କପା ଗଛର ଭଲ ବୃଦ୍ଧିହେବ ଯହିତ ଖରଚ କମ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ରୋଗ ଓ ପୋକ ଦାଉରୁ ଫସଲକୁ ରକ୍ଷା କରାଯାଇଥାଏ।

ମୃତ୍ତିକାସ୍ଵଚ୍ଛତା ଓ ଖାଦ୍ୟସାର ପରିଚାଳନା

ମୃତ୍ତ୍ୟୁଖାଦ୍ୟସାରର ସଠିକ ପରିଚାଳନା:

କିଛି ବର୍ଷ ଅନ୍ତରେ ଫସଲ ପରିବର୍ତ୍ତନକରିବ, ମାଟି ପରୀକ୍ଷା କରି ସଠିକ ପରିମାଣରେ ରାସାୟନିକ ସାରପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଓ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଜୈବିକପଦାର୍ଥ ବ୍ୟବହାର କରିବା।

ଅନୁସରଣ ବ୍ୟବହାର

ଜିଙ୍କ, ବୋରନ, ମ୍ୟାଗନେଶିୟମ ଓ ମାଙ୍ଗାନିଜ ଭଳି ଅନୁସରଣ ଅଭାବ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସଠିକ ସମୟରେ ଓ ସଠିକ ମାତ୍ରାରେ ପାତ୍ର ସିଂଚନ କରିବା ଉଚିତ।

ସମନ୍ୱିତ ରୋଗ ପରିଚାଳନା

ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣେଇବା:

ଉତ୍ତମଚେର ଓ ପତ୍ରକୁ ଆକ୍ରମଣକରୁଥିବା ଜୀବାଣୁମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଜମିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଓ ସଫା ରଖିବା, ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଜୈବିକ କୀଟଓଫିମିନାଶକ ଏବଂ ଯିବାନୁ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦରକାର।

ଗଛରେ ଲାଗୁଥିବା ରୋଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ:

ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅଧିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ଥିବା ସମୟରେ ଅଧିକ ରୋଗ ସଂକ୍ରମଣ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ପ୍ରତିଦିନ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ଉଚିତ ଓ କୌଣସି ରୋଗ ଅତିମାତ୍ରାରେ ଫସଲକୁ କ୍ଷତି କରିବାର ଆଶଙ୍କା ଥିଲେ ସଠିକ ଔଷଧକୁ ସଠିକ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଉଚିତ।

ସମନ୍ୱିତ ପୋକ ପରିଚାଳନା

ନିୟମିତ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରିବା:

ଫସଲର ବୃଦ୍ଧି ସମୟରେ ନିୟମିତ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ଦ୍ଵାରା ଏହି ରୋଗ ଥିବା ଲକ୍ଷଣ ଓ ପୋକ, ପତ୍ରାଦି ଅଁପୋପୋକ, ପତ୍ରଭୁକ୍ତ, ଧଳାମାଛି ଭଳି ଶୋଷକ ପୋକ ଓ ବକର ବିକ୍ଷାପୋକର ଆକ୍ରମଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବ ଏହିତ ଉଚିତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ହେବ।

ସଜାଆକର୍ଷକ ଜଡ଼ା ଓ ଜୈବ କୀଟନାଶକର ବ୍ୟବହାର:

ଫସଲର ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ସଙ୍ଗା ଆକର୍ଷକ ଛାବ ସାଲବାହାରୀ ପୋକମାନଙ୍କର ଗତିବିଧି ଓ ଅଣ୍ଟା ଦେବା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ମିଳିପାରିବ ଓ ପାକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଥମରୁ ରାସାୟନିକ କୀଟନାଶକ ବ୍ୟବହାର ନ କରି ଜୈବ କୀଟନାଶକ ତଥା ନିମ୍ନ ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ।

ଉପକାରୀ କୀଟଗୁଡ଼ିକର ସଂରକ୍ଷଣ:

ଉପକାରୀ କୀଟଗୁଡ଼ିକର ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାହାରୀ ଅପକାରୀ କୀଟମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମରୁ କୌଣସି ରାସାୟନିକ କୀଟନାଶକ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଅନୁଚିତ ।

ରାସାୟନିକ କୀଟନାଶକର କମ ବ୍ୟବହାର:

ପୋକର ପ୍ରକାର ଭେଦ ଓ ଆର୍ଥିକ ଦହେଲି ସୀମା ଅନୁସାରେ ଅନୁମୋଦିତ ରାସାୟନିକ କୀଟନାଶକ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ଉଚିତ ।

ସ୍ଥାନୀୟ ପରାମର୍ଶ:

ଓଡ଼ିଶାରେ କପା ଫସଲ ୫୪ ରୁ 61 ଦିନ ଅବସ୍ଥାରେ କଢ଼ ଓ ଫୁଲ ଓ ଫଳ ଧରିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି । କୋଡ଼ା ଖୋସା କରି ଘାସ ବାଛି ଦିଅନ୍ତୁ । ତୃତୀୟ ଦଫା ସାର ହିସାବରେ ୨୫ % ଯାବସାରଜନ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ଜମିରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ନାଳୀର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ । ଜମିର ପାଗ ଓ ବା ଥିଲେ ଓ କୋଡ଼ା ଖୋସା କରି ଘାସ ବାଛି ନ ପାରିଲେ ୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ୨ ମିଲି କ୍ଲିଜାକ୍ସୋପ ଇଥାଇଲ ୫% ଇସି(ସରୁ ପତ୍ର ଘାସ ପାଇଁ) ସହିତ ୧.୫ ମିଲି ପାଇରିଥାଆବକ ସୋଡ଼ିୟମ ୧୦% ଇସି (ବଡ଼ ପତ୍ର ଘାସ ପାଇଁ) କିମ୍ବା ୨-୨.୫ ମିଲି ପାଇରିଥାଆବକ ସୋଡ଼ିୟମ ୬ % ଓ କ୍ଲିଜାକ୍ସୋପ ଇଥାଇଲ ୫% ଘାସମରା ଔଷଧ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ । ରୋଗ ଓ ପୋକ ଆକ୍ରମଣର ଅବସ୍ଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଫସଲ ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ । ସୋଶୋକ ପୋକ ଯଥା ଜର ପୋକ ନ ଲାଗିବା ପାଇଁ ୧୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ୩୦ ମିଲି ନିମ୍ନ ଔଷଧ (୧୫୦୦ PPM) ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ । କପା ଫସଲ 60 ଦିନର ହେବ ପରେ କିମ୍ବା ଯଦି ପୋକ ସଂଖ୍ୟା ଆର୍ଥିକ ଦହେଲି ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କଲେ (୧୦ % ଗଛ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ) ୧୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ୨୦ ମିଲି ବ୍ରୁପ୍ରୋଫେଜିନ କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ । ଲେଡ଼ା ପୋକର ଆକ୍ରମଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେକ୍ଟର ପିଛା 5 ଟି ସାଙ୍ଗ ଆକର୍ଷକ ଜନତା ବସାନ୍ତୁ । ଝଞ୍ଜଳା ରୋଗର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଲିଟର ପିଛା 10 ମି ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ କୋବଲ୍ କୋରାଇଡ଼ ଅଭିଷସଧ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ୧୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ୨୫୦ ଗ୍ରାମ କୋପର ଆକ୍ସିକ୍ଲୋରାଇଡ଼ ୫୦% WP କିମ୍ବା ୧୦୦ ଗ୍ରାମ କରବେନଡାଜିମ ୫୦% WP ସହିତ ୨ କିଗ୍ରା ଯୁରିୟା ସାର ମିଶାଇ ଗଛ ମୂଳରେ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ । କଢ଼ ଓ ଫୁଲ ଝଡ଼ିବା କମ କରିବା ପାଇଁ କପ ଲଗାଇବାର ୬୦ ଦିନ ପରେ ୧୫ ଲିଟର ପାଣିରେ ୬.୦ ମିଲି ହିସାବରେ ଆଲଫା ନପ୍ଥାଲିକ ଏସିଟିକ ଏସିଡ଼ (ପ୍ଲାନୋଫିକ୍ସ) ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ । ନାଲି ପାତ୍ର ଅଗର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ୧୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ୧୦୦ ଗ୍ରାମ ମ୍ୟାଗନେଶିୟମ ସଲଫେଟ ସହିତ ୧୦୦ ଗ୍ରାମ ଯୁରିୟା ସାରା ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ । ଚେର ଶଜା ଓ ଝଞ୍ଜଳା ରୋଗର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ରୋଗର ସଂକେତ ମିଳିବ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ୧୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ୫୦ ଗ୍ରାମ ଟ୍ରାଇକୋଡର୍ମା ଭିରିଡି ୧% WP କିମ୍ବା ୨୦ ଗ୍ରାମ କରବେନଡାଜିମ ୫୦% WP ଅଭିଷଧକୁ ଗଛ ମୂଳରେ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।

ଉନ୍ନତ କପା ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରଣାଳୀ ଯଥାମୁକ୍ତିକାଓବିହନଚୟନ, ସାରପ୍ରୟୋଗ, ବୃଦ୍ଧିବାପକ୍ଷତି, ଜଳସେଚନ ଓ ଘାସପରିଚାଳନା, ରୋଗପୋକପରିଚାଳନା ଇତ୍ୟାଦିଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଟୋଏଡଆଧାରିତ (ସିଆଇସିଆରକଟନଆପ(CICRCottonApp ଯାହାକି ଆଇସିଏଆର-ସିଆଇସିଆର, ନାଗପୁର ଦ୍ଵାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି) ସେଥିରୁ ମିଳିପାରିବ ଶୁଗଲ ପ୍ଲେଣ୍ଟିଫରମରୁ ଏହି ଆପକୁ ମାଗଣାରେ ଡାଉନଲୋଡକରାଯାଇପାରିବ ଏହାଛଡାଫସଲର ଅବସ୍ଥା ଓ ପାଣିପାଗଭିତ୍ତିକ ସାପ୍ତାହିକ ପରାମର୍ଶଗୁଡ଼ିକ ଆଇସିଏଆର-ସିଆଇସିଆରୱେବସାଇଟ(<https://cicr.org.in/resource-weekly-advisory>)ରେ ଅପଲୋଡକରାଯାଇଛି, ଯାହା ସବୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଉପକାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିବ ।