

**ଭା.କୃ.ଅ.ନୁ.ପ.- କୃତ୍ରୀୟକପାଚୁବେଷଣାପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ନାଗପୁର
କପାଚାଷପାଇXIV (ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ) ସାପ୍ତାହିକପରାମର୍ଶ**

ODISHA		ପୂର୍ବସପ୍ତାହରେବାସ୍ତବିକବର୍ଷା(ମିମି)					ଆଗାମୀସପ୍ତାହରେଆନୁମାନିକବର୍ଷା(ମିମି)				
		ସେପ୍ଟେମ୍ବର					ସେପ୍ଟେମ୍ବର				
		03	04	05	06	07	09	10	11	12	13
	କୋରାପୁଟ	0	0	0	0	0	2	2.3	18	19.7	9.4
	କଳାହାଣ୍ଡି	0	0.8	0	0	0	1.4	3	24	17.9	7.4
	ବଲାଙ୍ଗୁର	0	0	0	0	0	1.8	4.6	19	17.9	9.8
ବର୍ଷା ଯାମାକାଶଓରଜାସଂକେତ		୦.୧ରୁ ୨.୪ ମିମି		୨.୫ରୁ ୧୫.୫ ମିମି		୧୫.୬ରୁ ୬୫.୫ ମିମି		୬୫.୬ରୁ ୧୧୫.୫ ମିମି		୧୧୫.୬ରୁ ୨୦୫.୫ ମିମି	
ବର୍ଷାପ୍ରକାର		ଅତ୍ୟଧିକବର୍ଷା		ଅଧିକବର୍ଷା		ସାଧାରଣବର୍ଷା		ପ୍ରବଳବର୍ଷା		ଅତ୍ୟଧିକବର୍ଷା	

କପାଫସଲର ଅବସ୍ଥା:

ଓଡ଼ିଶାରେକପା ଫସଲ ୬୪ ରୁ ୬୮ ଦିନ ଅବସ୍ଥାରେ କଢ଼ ଓ ବଜରା ଧରିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଲଘୁତାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ହେବ ଫଳରେ ଜମିରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରିବା କମ ଚାଲିଛି। ଚୂଡ଼ୀୟ ଦଫା ସାରା ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ରୋଗ ଓ ପୋକ ମର ଔଷଧ ସିଂଚନ କରିବା କମ ଚାଲିଛି। ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଘାସ ଯଥା ବଡ଼ ପତ୍ର, ସରୁ ପତ୍ର ଓ ମୁଥା ଜାତୀୟ ଘାସ ଉଠିଛି କିନ୍ତୁ ଘାସମରା ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥିବାରୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଛି। କେତକ ସ୍ଥାନରେ ଜଉ ପୋକ, ପତ୍ର ଡିଆଁ ପୋକ ଓ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ହେବ। ଫଳରେ ଝଉଳା ରୋଗ ଲାଗିବା ଓ ପତ୍ରରେ ନାଲି ଦାଗ ପଡ଼ିବ। ସୂଚନା ରହିଛି ଲେତକ ସ୍ଥାନରେ ଅଧିକ ପାଣି ଜମି ଥିବାରୁ ପତ୍ରରେ ନାଲି ଦାଗ ପଡ଼ିଛି, ଏହାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ୧୦୦ ଗ୍ରାମ ମନ୍ତେସିଅମ ସିଲେଟ ସହିତ ୧୦୦ ଗ୍ରାମ ଯୁରିୟା ସାର ୧୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କର ଯାଇଛି।

ମୃତ୍ତିକାର ସ୍ୱଚ୍ଛ, ରୋଗ ପୋକ, ଓ ଖାଦ୍ୟସାର ପରିଚାଳନା ଉପରେ ସାଧାରଣ ପରାମର୍ଶ

କପାଫସଲରୁ ଅଧିକ ଅମଳପାଇବାପାଇଁ ସମତୁଲ୍ୟ ଖାଦ୍ୟସାର ଓ ସମନ୍ୱିତ ରୋଗପୋକପରିଚାଳନା କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଏହାଦ୍ୱାରା କପାଗଛର ଭଲ ଚୁକ୍ତି ହେବ ଯାହା ଖରଚକମ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ରୋଗ ଓ ପୋକଦ୍ୱାରା ଫସଲ କ୍ଷତିରାଜିଥାଏ।

ମୃତ୍ତିକା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଖାଦ୍ୟସାର ପରିଚାଳନା

ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟସାରର ସଠିକ ପରିଚାଳନା:

କିଛି ବର୍ଷ ଅନ୍ତରେ ଫସଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ମାଟି ପରୀକ୍ଷା କରି ସଠିକ ପରିମାଣରେ ରାସାୟନିକ ସାରପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଓ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଜୈବିକପଦାର୍ଥ ବ୍ୟବହାର କରିବା।

ଅନୁସନ୍ଧାନ ବ୍ୟବହାର

ଜିଙ୍କ, ବୋରନ, ମ୍ୟାଗନେଶିୟମ ଓ ମାଙ୍ଗାନିଜ ଭଳି ଅନୁସନ୍ଧାନ ଅଭାବ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସଠିକ ସମୟରେ ଓ ସଠିକ ମାତ୍ରାରେ ପାତ୍ର ସିଂଚନ କରିବା ଉଚିତ।

ସମନ୍ୱିତ ରୋଗପରିଚାଳନା

ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣେଇବା:

ଉତ୍ତମତର ଓ ପତ୍ରକୁ ଆକ୍ରମଣକରୁ ଥିବା ଜୀବାଣୁମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଜମିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଓ ସଫା ରଖିବା, ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଜୈବିକ କୀଟଓଫିମିନାଶକ ଏବଂ ଯିବାକୁ ସାରପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦରକାର।

ଗଛରେ ଲାଗୁଥିବା ରୋଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ:

ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅଧିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ଥିବା ସମୟରେ ଅଧିକ ରୋଗ ସଂକ୍ରମଣ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ପ୍ରତିଦିନ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ଉଚିତ ଓ କୌଣସି ରୋଗ ଅତିମାତ୍ରାରେ ଫସଲକୁ କ୍ଷତି କରିବାର ଆଶଙ୍କା ଥିଲେ ସଠିକ ଔଷଧକୁ ସଠିକ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଉଚିତ।

ସମନ୍ୱିତ ପୋକପରିଚାଳନା

ନିୟମିତ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରିବା:

ଫସଲରୁ ବୃଦ୍ଧି ସମୟରେ ନିୟମିତ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରତି ଦର୍ଶନ କରିବା ଦ୍ଵାରା ଏହି ରେଲାଗୁଥିବା ଲକ୍ଷଣ ପୋକ, ପତ୍ରାଦି ଅପୋପୋକ, ପତ୍ରଭୁକ୍ତୀ, ଧଳାମାଛି ଭଳି ଶୋଷକ ପୋକ ଓ ବକର ବିକ୍ଷା ପୋକର ଆକ୍ରମଣ ବିଷୟରେ ଜାଣି ପାରିବ ସହିତ ଉଚିତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ହେବ

ସଜାଆକର୍ଷକ ଜଟା ଓ ଜୈବ କୀଟନାଶକ ବ୍ୟବହାର:

ଫସଲର ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ସଜା ଆକର୍ଷକ ଜଟା ବସାଇବା ଦ୍ଵାରା ପୋକମାନଙ୍କର ଗତି ବିଧି ଓ ଅଣ୍ଡା ଦେବା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ମିଳି ପାରିବ ଓ ପୋକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଥମରୁ ରାସାୟନିକ କୀଟନାଶକ ବ୍ୟବହାର ନ କରି ଜୈବ କୀଟନାଶକ ତଥା ନିମ୍ନ ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ।

ଉପକାରୀ କୀଟଗୁଡ଼ିକର ସଂରକ୍ଷଣ:

ଉପକାରୀ କୀଟଗୁଡ଼ିକର ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ଦ୍ଵାରା ଅପକାରୀ କୀଟମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇ ପାରିବ,

ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମରୁ କୌଣସି ରାସାୟନିକ କୀଟନାଶକ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଅନୁଚିତ ।

ରାସାୟନିକ କୀଟନାଶକର କମ ବ୍ୟବହାର:

ପୋକର ପ୍ରକାର ଭେଦ ଓ ଆର୍ଥିକ ଦହେଲି ସୀମା ଅନୁସାରେ ଅନୁମୋଦିତ ରାସାୟନିକ କୀଟନାଶକ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ଉଚିତ ।

ସ୍ଥାନୀୟ ପରାମର୍ଶ:

ଓଡ଼ିଶାରେ କପା ଫସଲ ୬୪ ରୁ ୬୮ ଦିନ ଅବସ୍ଥାରେ କଢ଼ ଓ ଫୁଲ ଓ ଫଳ ଧରିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି । କୋଡ଼ା ଖୋସା କରି ଘାସ ବାଛି ଦିଅନ୍ତୁ । ତୃତୀୟ ଦଫା ସାର ହିସାବରେ ୨୫ % ଯାବକ୍ଷାରଜନ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ଜମିରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ନାଳୀର

ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ । ଜମିର ପାଗ ଓଦା ଥିଲେ ଓ କୋଡ଼ା ଖୋସା କରି ଘାସ ବାଛି ନ ପାରିଲେ ୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ୨ ମିଲି କ୍ଲିଜାକ୍ସୋପ ଇଥାଇଲ ୫% ଇସି(ସରୁ ପତ୍ର ଘାସ ପାଇଁ) ସହିତ ୧.୫ ମିଲି ପାଇରିଥାଆବକ ସୋଡ଼ିୟମ ୧୦% ଇସି (ବଡ଼ ପତ୍ର ଘାସ ପାଇଁ) କିମ୍ବା ୨-୨.୫ ମିଲି ପାଇରିଥାଆବକ ସୋଡ଼ିୟମ ୬ % ଓ କ୍ଲିଜାକ୍ସୋପ ଇଥାଇଲ ୫% ଘାସମରା ଔଷଧ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ । ରୋଗ ଓ ପୋକ ଆକ୍ରମଣର ଅବସ୍ଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଫସଲ ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ । ସୋଶୋକ ପୋକ ଯଥା ଜଉ ପୋକ ନ ଲାଗିବା ପାଇଁ ୧୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ୩୦ ମିଲି ନିମ୍ନ ଔଷଧ (୧୫୦୦ PPM) ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ । କପା ଫସଲ 60 ଦିନର ହେବ ପରେ କିମ୍ବା ଯଉ ପୋକ ସଂଖ୍ୟା ଆର୍ଥିକ ଦହେଲି ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କଲେ (୧୦ % ଗଛ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ) ୧୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ୨୦ ମିଲି ବୁପ୍ରୋଫେଜିନ କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ । ପୋକର ଓ ପାଟଳ ବକରା ବିକ୍ଷା ପୋକର ଆକ୍ରମଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେକ୍ଟର ପିଛା 5 ଟି ସାଙ୍ଗ ଆକର୍ଷକ ଜନତା ବସାନ୍ତୁ ଝଞ୍ଜାଳା ରୋଗର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଲିଟର ପିଛା 10 ମି ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ କୋବଲ୍ କୋରାଇଡ ଅଭିଷସଧ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ୧୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ୨୫୦ ଗ୍ରାମ କୋପର ଆକ୍ସିକ୍ଲୋରାଇଡ ୫୦% WP କିମ୍ବା ୧୦୦ ଗ୍ରାମ କରବେନଡାଜିମ ୫୦% WP ସହିତ ୨ କିଗ୍ରା ଯୁରିୟା ସାର ମିଶାଇ ଗଛ ମୂଳରେ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ଓ ଫୁଲ ଝଡ଼ିବା କମ କରିବା ପାଇଁ କପ ଲଗାଇବାର ୬୦ ଦିନ ପରେ ୧୫ ଲିଟର ପାଣିରେ ୭.୦ ମିଲି ହିସାବରେ ଆଲଫା ନପ୍ଥାଲିକ ଏସିଡିକ ଏସିଡ (ପ୍ଲାନୋଫିକ୍ସ) ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ । ନାଲି ପାତ୍ର ଅଗର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ୧୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ୧୦୦ ଗ୍ରାମ ମ୍ୟାଗନେଶିୟମ ସଲଫେଟ ସହିତ ୧୦୦ ଗ୍ରାମ ଯୁରିୟା ସାରା ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ । ତେର ଶଙ୍ଖା ଓ ଝଞ୍ଜାଳା ରୋଗର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ରୋଗର ସଂକେତ ମିଳିବ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ୧୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ୫୦ ଗ୍ରାମ ଟ୍ରାଇକୋଡର୍ମା ଭିରିଡି ୧% WP କିମ୍ବା ୨୦ ଗ୍ରାମ କରବେନଡାଜିମ ୫୦% WP ଅଭିଷଧକୁ ଗଛ ମୂଳରେ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।

ଉନ୍ନତ କପା ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରଣାଳୀ ଯଥାମୁକ୍ତିକା ଓ ବିହନ ଚୟନ, ସାର ପ୍ରୟୋଗ, ବୁଣିବା ପଦ୍ଧତି, ଜଳ ସେଚନ ଓ ଘାସ ପରିଚାଳନା, ରୋଗ ପୋକ ପରିଚାଳନା ଇତ୍ୟାଦି ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଟାଏତ ଆଧାରିତ (ସିଆଇସିଆର କଟନ ଆପ(CICRCottonApp) ଯାହାକି ଆଇସିଏଆର-

ସିଆଇସିଆର, ନାଗପୁର ଦ୍ଵାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ସେଥିରୁ ମିଳିପାରିବ ଶୁଗଲ ପ୍ଲେଷ୍ଟୋରୁ ଏହି ଆପକୁ ମାଗଣାରେ ଡାଉନଲୋଡ କରାଯାଇ ପାରିବ ।

ସି ଆ ଇ ସି ଆ ର ୱେ ବ ସା ଇ ଟ (<https://cicr.org.in/resource-weekly-advisory>) ରେ ଅପଲୋଡ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ସବୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଉପକାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିବ ।