ଭା.କୃ.ଅ.ନୁ.ପ.- କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କପା ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ,ନାଗପୁର
କପା ଚାଷ ପାଇଁ XXI (ଏକବିଂଶ) ସାପ୍ତାହିକ ପରାମର୍ଶ

ODISHA		ପୂର୍ବ ସପ୍ତାହରେ ବାସ୍ତବିକ ବର୍ଷା(ମିମି)					ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହରେ ଆନୁମାନିକ ବର୍ଷା(ମିମି)				
		ଅକ୍ଟୋବର					ଅକ୍ଟୋବର/ନଭେମ୍ବର				
		22	23	24	25	26	28	29	30	31	01
	କୋରାପୁଟ	0	0	0	0	0	28	68	1.8	3.5	2.8
	କଳାହାଣ୍ଡି	0	0	0	0	0	15	44	5.2	1.5	3.4
	ବଲାଙ୍ଗିର	0	0	0	0	0	7	45	14	1.2	1.7
ବର୍ଷା ପରିମାଣ ଓ ରଙ୍ଗ ସଂକେତ		୦.୧ରୁ ୨.୪ ମିମି		୨.୫ ରୁ ୧୫.୫ ମିମି		୧୫.୬ ରୁ ୬୪.୪ ମିମି	୬୪.୫ ରୁ ୧୧୫.୫ ମିମି			୧୧୫.୬ ରୁ ୨୦୪.୪ ମିମି	
ବର୍ଷାପ୍ରକାର		ଅତି ଅଳ୍প ବର୍ଷା		ଅଳ୍ପବର୍ଷା		ସାଧାରଣ ବର୍ଷା	ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା			ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା	

କପାଫସଲର ଅବସ୍ଥା:

ଓଡ଼ିଶାରେକପା ଫସଲ ୧୧୩ ରୁ ୧୧୭ ଦିନ ଅବସ୍ଥାରେ ବକରା ବୃଦ୍ଧି ଓ ଫୁଟିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ବନ୍ଦ ହେବ ପରେ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳରେ ଘାସ ମରା ଔଷଧ ଓ ଜଉ ପୋକ, ଗୁଣିଆ ପୋକ ଓ ପତ୍ରମୋଡ ।ରାୟଗଡା, ବଲାଙ୍ଗୀର, ନୂଆପଡା ଓ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ପୋକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଔଷଧ ସିଂଚନ କର ଯାଇଛି। କପା ଗଛର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏନପିକେ ୧୯-୧୯-୧୯ ସରକୁ ପତ୍ର ସିଂଚନ କର ଯାଇଛି ।କେତକ ସ୍ଥାନରେ ଅଧିକ ପାଣି ଜମି ଥିବାରୁ ପତ୍ରରେ ନାଲି ଦାଗ ପଡିଛି, ଏହାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ୧୦୦ ଗ୍ରାମ ମଗ୍ନେସିଅମ ସଲ୍ଫେଟ ସହିତ ୧୦୦ ଗ୍ରାମ ୟୁରିୟା ସାର ୧୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କର ଯାଇଛି। ଲଗାଣ ବର୍ଷ ପାଇଁ କେତକ ସ୍ଥାନରେ ଝଡଂଳା ରୋଗ ଦେଖା ଯାଇଛି।

ମୃତ୍ତିକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ, ରୋଗ ପୋକ, ଓ ଖାଦ୍ୟସାର ପରିଚାଳନା ଉପରେ ସାଧାରଣ ପରାମର୍ଶ

କପାଫସଲରୁଅଧିକଅମଳପାଇବାପାଇଁସମତୁଲଖାଦ୍ୟସାରଓସମନ୍ୱିତରୋଗପୋକପରିଚାଳନାକରିବାନିହାତିଦରକାର।

ଏହାଦ୍ୱାରାକପାଗଛରଭଲବୃଦ୍ଧିହେବ ।ସହିତଖରଚକମହୋଇଥାଏଏବଂରୋଗଓପୋକଦାଉରୁଫସଲକୁରକ୍ଷାକରାଯାଇଥାଏ।

ମୃତ୍ତିକା ରସ୍ୱାସ୍ଥଓଖାଦ୍ୟସାରପରିଚାଳନା

ମୁଖ୍ୟଖାଦ୍ୟସାରରସଠିକପରିଚାଳନା:

କିଛି ବର୍ଷ ଅନ୍ତରରେ ଫସଲ ପରିବର୍ତନକରିବ, ମାଟି ପରୀକ୍ଷା କରି ସଠିକ ପରିମାଣରେ ରାସାୟନିକ ସାରପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଓ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଜୈବିକପଦାର୍ଥ ବ୍ୟବହାର କରିବା

ଅନୁସ । ରର ବ୍ୟବହାର

ଜିଙ୍କ, ବୋରନ, ମ୍ୟାଗନେଶିୟମ ଓ ମାଙ୍ଗାନିଜ ଭଳି ଅନୁସରର ଅଭାବ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସଠିକ ସମୟରେ ଓ ସଠିକ ମାତ୍ରାରେ ପାତ୍ର ସିଂଚନ କରିବା ଉଚିତ।

ସମନ୍ୱିତରୋଗପରିଚାଳନା

ପ୍ରତିଷେଧକବ୍ୟବସ୍ଥାଆପଣେଇବା:

ଉଭୟଚେରଓପତ୍ରକୁଆକ୍ରମଣକରୁଥିବାଜୀବାଣୁମାନଙ୍କୁନିୟନ୍ତ୍ରଣକରିବାପାଇଁଜମିକୁଭଲଭାବରେପ୍ରସ୍ତୁତକରିବାଓସଫାରଖିବା, ଅଧିକପରିମାଣରେଜୈବିକକୀଟଓଫିମପିନାଶକଏବଂଯିବାନୁସାରପ୍ରୟୋଗକରିବାଦରକାର।

ଗଛରେଲାଗୁଥିବାରୋଗନିୟନ୍ତ୍ରଣ:

ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେଅଧିକଆର୍ଦ୍ରତାଥିବାସମୟରେଅଧିକରୋଗସଂକ୍ରମଣହେବାରଆଶଙ୍କାଥିବାରୁପ୍ରତିଦିନକ୍ଷେତ୍ରପରିଦର୍ଶନକରିବାଉଚିତ। କୌଣସି ରୋଗଅତିମାତ୍ରାରେଫସଲକୁକ୍ଷତିକରିବାରଆଶଙ୍କାଥିଲେସଠିକଔଷଧକୁସଠିକମାତ୍ରାରେପ୍ରୟୋଗକରିବାଉଚିତ।

ସମନ୍ୱିତପୋକପରିଚାଳନା

ନିୟମିତକ୍ଷେତ୍ରପରିଦର୍ଶନକରିବା:

ଫସଲରବୃଦ୍ଧିସମୟରେନିୟମିତକ୍ଷେତ୍ରପରିଦର୍ଶନକରିବାଦ୍ୱାରା।ଏହିରେଲାଗୁଥିବାଲୁକଡପୋକ, ପତ୍ରାଦିଅଁପୋପୋକ, ପତ୍ରଉକୁଣି, ଧଳାମାଛିଭଳିଶୋଷକପୋକଓବକରିବିନ୍ଧାପୋକରଆକ୍ରମଣବିଷୟରେଜାଣିପାରିବସହିତଉଚିତନିୟନ୍ତ୍ରଣବ୍ୟବସ୍ଥାକରିହେବ

ସଙ୍ଗଆକର୍ଷକଜନ୍ତାଓଜୈବକୀଟନାଶକରବ୍ୟବହାର:

ଫସଲରପ୍ରାଥମିକଅବସ୍ଥାରେସଙ୍ଗଆକର୍ଷଜନ୍ତାବସାଇବାଦ୍ୱାରାପୋକମାନଙ୍କରଗତିବିଧିଓଅଣ୍ଡାଦେବାବିଷୟରେସୂଚନାମିଳିପାରିବ। ପୋକନିୟନ୍ତ୍ରଣପାଇଁପ୍ରଥମରୁରାସାୟନିକକୀଟନାଶକବ୍ୟବହାରନକରିଜୈବକୀଟନାଶକତଥାନିମ୍ବଔଷଧବ୍ୟବହାରକରିବାଉଚିତ।

ଉପକାରୀକୀଟଗୁଡିକରସଂରକ୍ଷଣ:

ଉପକାରୀକୀଟଗୁଡିକରସଂରକ୍ଷଣକରିବାଦ୍ୱାରାଅପକାରୀକୀଟମାନଙ୍କୁନିୟନ୍ତ୍ରଣକରାଯାଇପାରିବ,
ସେଥିପାଇଁପ୍ରଥମରୁକୌଣଶୀରାସାୟନିକକୀଟନାଶକବ୍ୟବହାରକରିବାଅନୁଚିତ।

ରାସାୟନିକକୀଟନାଶକରକମବ୍ୟବହାର:

ପୋକରପ୍ରକାରଭେଦଓଆର୍ଥିକଦହେଳିସୀମାଅନୁସାରେଅନୁମୋଦିତରାସାୟନିକକୀଟନାଶକବ୍ୟବହାରକରାଯିବଉଚିତ।

ସ୍ଥାନୀୟପରାମର୍ଶ:

ଓଡିଶାରେ କପା ଫସଲ ୧୧୩ ରୁ ୧୧୭ ଦିନ ଅବସ୍ଥାରେ ଫଳ ଧରିବା ଓ ଫୁଟିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଓଡିଶାର ସମସ୍ତ କପ ଚାଷୁ ହେଉଥିବା ଜିଲ୍ଲା ମନାକରେ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ବନ୍ଦ ହୋଇ ଯାଇଥିବାରୁ ଘାସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ରୋଗ ପୋକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଔଷଧ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।କପା ଗଛର ସଠିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏକର ପିଛା ୨.୦ କିଗ୍ରା ହିସାବରେ ୧୩:୦୦:୪୫ ସାରକୁ ୧୦ ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ଦୁଇ ଥର ପାତ୍ର ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।ପ୍ରାୟ ସବୁ ପ୍ରକାର ଘଷରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ୧୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ୫୦ ମିଲି ଗ୍ଲୁଫୋସିନେଟ ଆମୋନିୟମ ୧୩.୫% ଘାସମରା ଅଉଷଧକୁ ହୁଡ ବ୍ୟବହାର କରି କେବଳ ଘାସ ଉପରେ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।ରୋଗ ଓ ପୋକ ଆକ୍ରମଣର ଅବସ୍ଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଫସଲ ସବେକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ। ସୋଶୋକ ପୋକ ଯଥା ଜଉ ପୋକ ନ ଲାଗିବା ପାଇଁ ୧୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ୩୦ ମିଲି ନିମ୍ବ ଔଷଧ(୧୫୦୦ PPM) ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ। ଯଉ ପୋକ ସଂଖ୍ୟା ଆର୍ଥିକ ଦହେଳି ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କଲେ (୧୦ % ଗଛ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ) ୧୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ୨୦ ମିଲି ବୁପ୍ରୋଫେଜିନ କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।ଲେଡ। ପୋକର ଓ ପାଟଳ ବକରା ବିନ୍ଧା ପୋକର ଆକ୍ରମଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେକ୍ଟର ପିଛା 5 ଟି ସାଙ୍ଗ ଆକର୍ଷକ ଜନତା ବସାନ୍ତୁ ।ଝିଙ୍ଗା ରୋଗର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଲିଟର ପିଛା 10 ମି ଗ୍ରା ହିସାବରେ କୋବଲ୍ଟ କ୍ଲୋରାଇଡ ଅଉଷସଧ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ୧୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ୨୫୦ ଗ୍ରାମ କୋପର ଆକ୍ସିକ୍ଲୋରଇଡ ୫୦% WP କିମ୍ବା ୧୦୦ ଗ୍ରାମ କରବେନଦାଜିମ ୫୦% WP ସହିତ ୨ କିଗ୍ରା ୟୁରିୟା ସାର ମିଶାଇ ଗଛ ମୂଳରେ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ। ନାଲି ପାତ୍ର ଦାଗର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ୧୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ୧୦୦ ଗ୍ରାମ ମ୍ୟାଗନେଶିୟମ ସଲଫେଟ ସହିତ ୧୦୦ ଗ୍ରାମ ୟୁରିଯା ସାର ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।ଚେର ଶଢା ଓ ଝଉଂଳା ରୋଗର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ରୋଗର ସଂକେତ ମିଳିବ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ୧୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ୫୦ ଗ୍ରାମ ଟ୍ରାଇକୋଡର୍ମା ଭିରିଡି ୧% WP କିମ୍ବା ୨୦ ଗ୍ରାମ କରବେନଦାଜିମ ୫୦% WP ଅଉଷଧକୁ ଗଛ ମୂଳରେ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।

ଉନ୍ନତକପାଉତ୍ପାଦନପ୍ରଣାଳୀଯଥାମୃତ୍ତିକାଓବିହନଚୟନ,ସାରପ୍ରୟୋଗ,ବୁଣିବାପଦ୍ଧତି,ଜଳସେଚନଓଘାସପରିଚାଳନା,ରୋଗପୋକପରିଚାଳନାଇତ୍ୟାଦିଗୋଟିଏଅଣ୍ଡ୍ରୋଏଡଆଧାରିତ(ସିଆଇସିଆରକଟନଆପ(CICRCottonAppଯାହାକିଆଇସିଏଆରସିଆଇସିଆର,ନାଗପୁରଦ୍ୱାରାପ୍ରସ୍ତୁତକରାଯାଇଛିସେଥିରୁମିଳିପାରିବଶ୍ୱଗଲପ୍ଲେଷ୍ଟୋରରୁଏହିଆପକୁମାଗଣାରେଡାଉନଲୋଡକରାଯାଇପାରିବଏହାଛଡାଫସଲରଅବସ୍ଥା ଓପୋକିପାଗଭିତ୍ତିକସାପ୍ତାହିକପରାମର୍ଶଗୁଡିକଆଇସିଏଆର-ସିଆଇସିଆରୱେବସାଇଟ(https://cicr.org.in/resource-weekly-advisory) ରେଅପଲୋଡକରାଯାଉଛି,ଯାହାସବୁଚାଷୀମାନଙ୍କଉପକାରପାଇଁମଧ୍ୟମିଳିପାରିବ।