


ਆਈ. ਸੀ. ਏ. ਆਰ. - ਕੇਂਦਰੀ ਕਪਾਹ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ, ਨਾਗਪੁਰ

ਨਰਮੇ-ਕਪਾਹ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ 21ਵੀਂ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਸਲਾਹ (10 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 16 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਤੱਕ)

ਪੰਜਾਬ	ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਮੀਂਹ (ਮਿਲੀ ਮੀਟਰਾਂ ਵਿੱਚ-ਆਈ. ਐੱਮ. ਡੀ.)	ਮੀਂਹ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ (ਮਿਲੀ ਮੀਟਰਾਂ ਵਿੱਚ-ਆਈ. ਐੱਮ. ਡੀ.)									
		ਅਕਤੂਬਰ					ਅਕਤੂਬਰ				
		06	07	08	09	10	12	13	14	15	16
	ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ						0	0	0	2	1
	ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1
	ਮੁਕਤਸਰ	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
	ਬਠਿੰਡਾ	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
	ਸੰਗਰੂਰ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ਲੁਧਿਆਣਾ	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4
ਮੀਂਹ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਰੰਗ ਕੋਡ	0.1 to 2.4 ਮਿ. ਮੀ.	2.5 to 15.5 ਮਿ. ਮੀ.		15.6 to 64.4 ਮਿ. ਮੀ.		64.5 to 115.5 ਮਿ. ਮੀ.		115.6 to 204.4			
ਮੀਂਹ ਦੀ ਕਿਸਮ	ਬਹੁਤ ਹਲਕਾ ਮੀਂਹ	ਹਲਕਾ ਮੀਂਹ		ਮੱਧਮ ਦਰਜੇ ਦਾ ਮੀਂਹ		ਭਾਰਾ ਮੀਂਹ		ਬਹੁਤ ਭਾਰਾ ਮੀਂਹ			

ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਹਾਲਤ :

ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਫ਼ਸਲ 137 ਤੋਂ 152 ਦਿਨ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਟੀਂਡੇ ਬਣਨ ਅਤੇ ਖਿੜਣ ਲੱਗੇ ਹਨ । ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਚੁਗਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਸ ਚੂਸਣ ਵਾਲੇ ਕੀੜੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹਨ। ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹਰੇ ਟੀਂਡਿਆਂ ਵਿੱਚ 0-60 % ਅਤੇ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਟੀਂਡਿਆਂ ਵਿੱਚ 0-20 % ਸੀ। ਬਹੁਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਂਡੇ ਗਲਣ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ ।

ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਫ਼ਸਲ 152 ਤੋਂ 169 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟੀਂਡੇ ਪੱਕਣ ਅਤੇ ਖਿੜਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਚੁਗਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਲਾਹ :-

ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ 120-150 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫੇਨਪ੍ਰੋਪੈਥਰੀਨ 10 ਈ ਸੀ @ 300 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਜਾਂ ਸਾਈਪਰਮੇਥ੍ਰਿਨ 25 % ਈ ਸੀ @ 100 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਜਾਂ ਡੈਲਟਾਮੇਥਰੀਨ 2.8 ਈ ਸੀ @ 200 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਜਾਂ ਫੈਨਵੈਲੋਰੇਟ 20 ਈ ਸੀ @ 200 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਜਾਂ ਲੈਂਬਡਾ ਸਾਈਲੋਥਰਿਨ 5 % ਈ ਸੀ @ 200 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰੇ। ਟੀਂਡੇ ਗਲਣ ਅਤੇ ਪੱਤਿਆਂ ਤੇ ਉੱਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਪੱਥਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕਾਰਬੋਫੇਨਾਥਿਮ 50 ਡਬਲਯੂ ਪੀ @ 0.04 % ਜਾਂ ਕ੍ਰੋਮੋਕਸਿਮ ਮਿਥਾਈਲ 44.3 ਐਸਸੀ @ 0.1 % ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਪੀਨੇਬ 70 ਡਬਲਯੂ ਪੀ @ 0.25 % ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਪੀਕੋਨਾਜ਼ੋਲ 25 ਈ ਸੀ @ 0.01 % ਜਾਂ ਮੇਟੀਰਾਮ 55 % + ਪਾਈਰਾਕਲੋਸਟ੍ਰੋਬਿਨ 5 % ਡਬਲਯੂ ਜੀ @ 0.2 % ਜਾਂ ਅਜੋਕਸੀਸਟ੍ਰੋਬਿਨ 18.2 % ਡਬਲਯੂ / ਡਬਲਯੂ + ਡਿਫੇਨੋਕੋਨਾਜ਼ੋਲ 11.4 % ਡਬਲਯੂ / ਡਬਲਯੂ ਐਸਸੀ @ 0.1 % ਜਾਂ ਫਲੈਕਸਪਾਈਰੋਕਸੈਡ 167 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ + ਪਾਈਰਾਕਲੋਸਟ੍ਰੋਬਿਨ 333 (ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ) ਐਸ ਸੀ @ 0.6 % ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀ. ਟੀ. ਨਰਮੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਤੇ 2 ਛਿੜਕਾਅ 1 % ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਦੇ ਕਰਨ ।

ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ, ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਨਰਮਾ ਖਿੜਾਉਣ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਥਰੇਲ 39 % (ਈਥੇਫੇਨ 39 %) @ 5.0 ਮਿਲੀਲੀਟਰ / ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇੱਕ ਛਿੜਕਾਅ ਨਾਲ ਰਸਾਇਣਕ ਤੌਰ ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਪੱਤੇ ਝਾੜ ਲੈਣ । ਇਸ ਛਿੜਕਾਅ ਦੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 85-90 % ਪੱਤੇ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਸੰਘਣੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਰਾਲ ਵਾਲੇ

ਨਰਮੇ ਲਈ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਕੀਮਤ ਲੈਣ ਲਈ ਨਰਮਾ-ਕਪਾਹ ਸਾਫ਼, ਸੁੱਕਾ ਅਤੇ ਤੇਲ ਸੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁਣੇ। ਕਪਾਹ ਝੜਨ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਚੁਗਾਈ ਕਰੋ। ਨਰਮਾ-ਕਪਾਹ ਚੁਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿੱਲੇ ਖਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਰਮੇ-ਕਪਾਹ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਰਮੇ-ਕਪਾਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁੱਕੇ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਕੀਮਤ ਲੈਣ ਲਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਨਰਮੇ-ਕਪਾਹ ਨੂੰ ਅੱਡੋ-ਅੱਡ ਰੱਖੋ। ਆਖਰੀ ਚੁਗਾਈ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਨਰਮੇ-ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਛਟੀਆਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਅਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਮਲਬੇ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਪਲਟਾਊ ਪਲਾਓ ਹਲ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਦਿਓ।